

Werkafspraken "verdenking DVT" Hengelo Buiten kantooruren		
Versie: 4 Documentnr KIS: gelinkt aan: Datum laatste update: 04-07-2024	Beoordelaars: spoedzorg huisartsen Twente (SHT), Medlon, interne, radiologie	 
	Status: Gepubliceerd website ZGT	

- Onderstaande afspraken zijn weergegeven op het speciale formulier 'Verdenking DVT'. Via [deze link](#) te downloaden.
Let op: vul het formulier volledig in (arm / been, links / rechts etc.) en geeft het formulier mee aan de patiënt!
- De huisarts dient bij verdenking op een trombosebeen de '**Eerstelijnsbeslisregel**' toe te passen.
- Indien de huisarts zelf de DVT behandeling op zich wil nemen, dan kan de huisarts dit aankruisen op het formulier en wordt de patiënt na een positieve echo niet behandeld op de SEH, maar terugverwezen naar de 1^e lijn voor behandeling.
- Wanneer de uitslag van de '**Eerstelijnsbeslisregel**' ≤ 3 is wordt de 'D-dimeer' bepaald.
- **Traject A: Bloedafname**
De huisarts belt met de analist via telefoonnummer: 088-4633621 en meldt de patiënt aan, zie protocol "D-dimeren op de Spoedpost Hengelo"
- De SEH verpleegkundige prikt de patiënt en voert de analyse uit. De patiënt blijft wachten in de wachtkamer van de spoedpost huisartsen Hengelo op de uitslag. Het laboratorium in Almelo geeft de uitslag door aan (de aanvragend huisarts van) de Spoedpost huisartsen.
- De huisarts instrueert de patiënt: bij een positieve uitslag wordt de patiënt direct doorverwezen naar de spoedpost / SEH in ZGT Almelo voor het maken van een compressie echo. Dit kan tot uiterlijk 20.00 uur
- Bij een negatieve uitslag gaat de patiënt naar huis.
- **Traject B: Compressie echo**
Wanneer de uitslag van de 'Eerstelijnsbeslisregel' >3 is, wordt de patiënt naar de spoedpost / SEH in ZGT Almelo gestuurd voor een compressie echo. De huisarts overweegt of de patiënt in staat is met eigen vervoer te gaan en regelt zo nodig ambulancevervoer.
- De huisarts belt met 088 – 708 3580 en meldt de patiënt aan (voor compressie echo). Tot uiterlijk 20.00 uur kan er een compressie echo gemaakt worden.
De huisarts geeft de patiënt het formulier: "verdenking DVT" Hengelo (buiten kantooruren) mee via [deze link](#) te downloaden.
- De patiënt meldt zich bij de balie spoedpost / SEH in ZGT Almelo. De patiënt wordt door receptionist aangekondigd bij de dienstdoende assistent radiologie
- Bij een compressie Echo waarop een aantoonbare trombose te zien is, zorgt de afdeling Radiologie voor uitleg en verwijzing van de patiënt naar de SEH Almelo. De patiënt wordt op de SEH behandeld.
- Bij een compressie echo waarop een oppervlakkige kuitvene trombose of tromboflebitis is te zien, wordt de patiënt vanuit de afdeling radiologie terugverwezen naar de huisarts voor behandeling in de eerste lijn. De patiënt dient dan zelf de eerstvolgende werkdag contact op te nemen met de eigen huisarts.
- Bij een negatieve Echo wordt patiënt geadviseerd over vijf à zeven dagen contact op te nemen met de huisarts. Als de klachten blijven bestaan dient de Echo te worden herhaald.
- Zie ook processchema "verdenking DVT" Hengelo, buiten kantooruren. Via [deze link](#) te downloaden.

N.B. tussen 20.00 en 08.00 uur treedt de NHG Standaard DVT in werking

Geef de patiënt na 20.00 uur een afspraak mee voor de volgende dag:

Ma t/m vrijdag: 09.00 uur, afdeling radiologie, route 1.4 ZGT Almelo, melden bij de balie

Zaterdag en zondag: 10.00 uur, spoedpost / SEH, route 0.4 ZGT Almelo, melden bij de receptie

→ Patiënt dient het formulier "verdenking DVT" ingevuld mee te nemen!

Eerstelijnsbeslisregel voor trombosebeen

Item	Punten
1. Man	1
2. Gebruik orale anticonceptie	1
3. Aanwezigheid maligniteit	1
4. Operatie in de laatste maand	1
5. Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart	1
6. Uitgezette venen van het been	1
7. Verschil maximale kuitomvang ≥ 3 cm	2
* Tel de punten op.	
* Bij een score ≤ 3 : verricht een D-dimeertest zelf of in het laboratorium (cito).	
* Bij een score > 3 : geen D-dimeertest nodig	

Samenvatting

- ELB Score ≤ 3 *én* D-dimeertest negatief: DVT onwaarschijnlijk.
- ELB Score > 3 *óf* D-dimeertest positief: mogelijk DVT; verwijs *dezelfde* dag voor compressie-echografie.
- Een niet-comprimeerbare vene (positieve echo) wijst op DVT.
- Positieve D-dimeertest en een negatieve echo: herhaal compressie-echografie na vijf à zeven dagen. Is de echo wederom negatief, dan is er geen sprake van DVT.