

Werkafspraken “verdenking trombosebeen” Almelo Buiten kantooruren		
Versie: 4 Documentnr KIS: gelinkt aan: Datum laatste update: 17-03-2025	Beoordelaars: CHPA / FEA, Medlon, interne, radiologie	
	Status: Gepubliceerd website ZGT	

Ma t/m vrij: van 17.00 tot 20.00 uur
Zaterdag en zondag: van 10.00 tot 20.00 uur

- Onderstaande afspraken zijn weergegeven op het speciale formulier ‘Verdenking trombosebeen’ Almelo. [U kunt dit formulier downloaden via deze link.](#)
- Let op: vul het formulier volledig in en geef het formulier mee aan de patiënt!**
- De huisarts dient bij verdenking op een trombosebeen de ‘**Eerstelijnsbeslisregel**’ toe te passen.
- Indien de huisarts zelf de DVT behandeling op zich wil nemen, dan kan de huisarts dit aankruisen op het formulier en wordt de patiënt na een positieve echo niet behandeld op de SEH, maar terugverwezen naar de 1^e lijn voor behandeling.
- Wanneer de uitslag van de ‘**Eerstelijnsbeslisregel**’ ≤ 3 is wordt de ‘D-dimeer’ bepaald.
- Na 17.00 uur en in het weekend vindt bloedafname via de CHPA plaats.
- Traject A: bloedafname**
 Na 17.00 uur en in het weekend, wordt de patiënt bij een positieve uitslag door de huisarts van de CHPA verwezen naar de balie van de spoedpost (route 0.4) voor het maken van een echo, dit kan tot uiterlijk 20.00 uur. In het weekend tussen 10.00 en 20.00 uur.
 → Bij een negatieve D-dimeren uitslag én een ELB score <3 kan de patiënt naar huis.
- Traject B: compressie echo:**
Tussen 17.00 uur en 20.00 uur en in de weekenden tussen 10.00 en 20.00 uur belt de huisarts met 088 – 708 3580 en vraagt naar de dienstdoende assistent radiologie. Vervolgens stuurt de huisarts van de CHPA de patiënt naar de balie spoedpost / SEH (route 0.4) voor een compressie echo bij een ELB score >3 en / of bij afwijkende D-dimeren uitslag.
 → Wel het speciale formulier “Verdenking trombosebeen” aan patiënt meegeven!
Na 20.00 uur: geef de patiënt een afspraak mee voor de volgende dag:
 Ma t/m vrij: om 09.00 uur, melden bij balie afdeling radiologie ZGT Almelo, route 1.6
 Za en zo: om 10.00 uur, melden bij receptie spoedpost / SEH ZGT Almelo, route 0.4
 -> Wel het speciale formulier “Verdenking trombosebeen” aan patiënt meegeven!
- Bij een compressie echo waarop een aantoonbare trombose te zien is, zorgt de afdeling radiologie voor uitleg en verwijzing van de patiënt naar de SEH (route 0.4). De patiënt wordt op de SEH behandeld.
- Bij een compressie echo waarop een oppervlakkige kuitvene trombose of tromboflebitis is te zien, wordt de patiënt vanuit de afdeling radiologie terugverwezen naar de huisarts voor behandeling in de eerste lijn. De patiënt dient dan zelf de eerstvolgende werkdag contact op te nemen met de eigen huisarts.
- Bij een negatieve echo wordt patiënt geadviseerd over vijf à zeven dagen contact op te nemen met de huisarts. Als de klachten blijven bestaan dient de echo te worden herhaald.
- [Zie ook processchema “verdenking trombosebeen” Almelo.](#)

Eerstelijnsbeslisregel (*bij verdenking trombosebeen*)

Item	Punten
1. Man	1
2. Gebruik orale anticonceptie	1
3. Aanwezigheid maligniteit	1
4. Operatie in de laatste maand	1
5. Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart	1
6. Uitgezette venen van het been	1
7. Verschil maximale kuitomvang ≥ 3 cm	2
* Tel de punten op.	
* Bij een score ≤ 3 : verricht een D-dimeertest zelf of in het laboratorium (cito).	
* Bij een score > 3 : geen D-dimeertest nodig	

Samenvatting

- ELB Score ≤ 3 *én* D-dimeertest negatief: DVT onwaarschijnlijk.
- ELB Score > 3 *óf* D-dimeertest positief: mogelijk DVT; verwijs *dezelfde* dag voor compressie-echografie.
- Een niet-comprimeerbare vene (positieve echo) wijst op DVT.
- Positieve D-dimeertest en een negatieve echo: herhaal compressie-echografie na vijf à zeven dagen. Is de echo wederom negatief, dan is er geen sprake van DVT.