

Longfunctieonderzoek: Hyperventilatie

Inleiding

Met dit onderzoek wordt vastgesteld of uw klachten in verband staan met hyperventilatie. Bij hyperventilatie ademt u teveel, waardoor er een tekort aan koolzuur ontstaat in uw lichaam.

Vorbereiding

Rustgevende medicatie dient u 24 uur van tevoren in overleg met uw behandelend arts te stoppen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om een klachtenlijst in te vullen. Daarna gaat u op een onderzoeksbank liggen. U krijgt elektroden op de borst om een hartfilmpje te registreren. Om de ademhaling te meten krijgt u een mondstuk in de mond en een neusklem op of een masker op uw gezicht.

U wordt gevraagd eerst enkele minuten rustig te ademen en daarna twee tot drie minuten zo snel en zo diep als u kunt te ademen. Daarna mag u gedurende circa vijf minuten weer normaal ademen.

Na het onderzoek wordt u gevraagd naar eventuele klachten die zijn ontstaan door de test.

Complicaties en bijwerkingen

U kunt na de test last krijgen van duizeligheid, misselijkheid, tintelingen of vermoeidheid. Deze klachten verdwijnen meestal in de loop van de dag.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 45 minuten.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u bellen met het secretariaat longgeneeskunde.

Locatie en route

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het secretariaat longgeneeskunde:

Ziekenhuislocatie Hengelo, route 0.9.
Telefoonnummer 088 708 33 00

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt