

Het verloop van de Carboplatin/Pemetrexed kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Carboplatin
2. Pemetrexed (= Alimta)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C																					
P																					

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De toediening duurt ongeveer 2 uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie krijgt u een vitamine B12 injectie, dit wordt om de 9 weken herhaald zolang u aan het kuren bent. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie gaat u starten met foliumzuur, elke ochtend 1 tablet. Hier gaat u mee door tot en met 3 weken na de laatste chemokuur. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt