

Het verloop van de Cisplatin/Gemcitabine kuur (4 wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Cisplatin
2. **G**emcitabine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
C																											
G							G							G													

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie en de verpleegafdeling oncologie van de ZGT.

De Cisplatin en Gemcitabine worden u toegediend op dag 1. Hierna wordt u 1 nacht opgenomen voor het toedienen van extra vocht. De Gemcitabine wordt op dag 8 en 15 nogmaals toegediend, dit duurt ongeveer 45 minuten.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 4 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 3 a 6 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw arts.
- Om schadelijke werking van cytostatica op uw nieren te verminderen krijgt u tijdens de behandeling extra vocht toegediend. Daarvoor dient u een nacht opgenomen te blijven.
- U kunt vocht gaan vasthouden en daardoor in gewicht toenemen.
- Deze kuur kan griepachtige verschijnselen veroorzaken, u kunt daardoor spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen. Zo nodig kunt u maximaal 4 keer daags 1000 mg paracetamol innemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 en van dag 8 tot 11 en van dag 15 tot 18 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.