

Het verloop van de Docetaxel / Carboplatin / Trastuzumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **Docetaxel** (=Taxotere)
2. **Carboplatin**
3. **Trastuzumab** (=Herceptin)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D C T																					

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. Bij de 1^e kuur krijgt u de Trastuzumab op dag 1, waarna u nog 4,5 uur na toediening ter observatie moet blijven (totaal 6 uur). Op dag 2 krijgt u de Docetaxel en de Carboplatin. Dit duurt ongeveer 3 uur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de 1^{ste} toediening wordt bij de volgende kuren de Trastuzumab, de Docetaxel en de Carboplatin op één dag gegeven. De toediening duurt vanaf dan ongeveer 3 uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal 4 keer daags 1000 mg Paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 2 á 3 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en/of de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen