

Het verloop van de FOLFIRINOX kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. Oxaliplatin
2. Irinotecan
3. Leucovorin
4. Fluorouracil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O													
I													
L													
F	F	F											

Wijze van toedienen, waar en hoe vaak?

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Dit gebeurt op de oncologie afdeling van de ZGT. U blijft voor deze kuur 2 nachten opgenomen.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 2 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om bijwerkingen tegen te gaan.
- Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan 4x daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Drink zo min mogelijk koude dranken en kleed u zo warm mogelijk aan.
- Tijdens de toediening van Oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel. Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken, vreemd gevoel in de tong
- Resten cytostatica kunnen tot dag 8 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen