

Het verloop van de FOLFOX kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **O**xaliplatin
2. **F**olinezuur
3. **F**luorouracil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O F FI	F FI	FI											

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling oncologie van de ZGT. Voor deze chemokuur wordt u 2 nachten opgenomen. De volgende kuur start in principe 2 weken na dag 1 als de bloeduitslagen goed zijn.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Drink zo min mogelijk koude dranken en kleeft u zo warm mogelijk aan.
- Tijdens de toediening van Oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel. Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken, vreemd gevoel in de tong
- Resten cytostatica kunnen tot dag 7 in het lichaamsvocht (onder meer in urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt