

Het verloop van de Gemcitabine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1. Gemcitabine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
G							G							G													

Wijze van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De toediening duurt ongeveer 45 minuten.

De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen 3x wekelijks gegeven, gevolgd door een week rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 3 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt