

## Het verloop van de **Irinotecan/ Fluorouracil/Leucovorin/Bevacizumab**

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **I**rinotecan
2. **F**luorouracil
3. **L**euovorin
4. **B**evacizumab

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| I |   |   |   |   |   |   | I |   |    |    |    |    |    | I  |    |    |    |    |    |    |
| F |   |   |   |   |   |   | F |   |    |    |    |    |    | F  |    |    |    |    |    |    |
| L |   |   |   |   |   |   | L |   |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    |    |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| I  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| B  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op oncologiepoli van de ZGT.

De toediening duurt ongeveer 2 uur, waarbij de eerste en de vierde kuur door de Bevacizumab langer duren. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen 4x wekelijks gegeven, gevolgd door 2 weken rust.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door de Bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Voorafgaande en aan het einde van de Bevacizumab wordt daarom de bloeddruk gemeten.
- Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om bijwerkingen tegen te gaan.
- Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan 4x daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

uw ontlastingspatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.

- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

**De bijwerkingen van de Bevacizumab staan beschreven in het bijgeleverde informatieboekje.**

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen