

Het verloop van de Irinotecan kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit 1 medicijn.

1. Irinotecan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I																					

Wijze van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De toediening duurt ongeveer 1,5 uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 ° C moet u contact met ons opnemen.
- Als meest voorkomende bijwerking kan diarree optreden. Deze diarree wordt onderverdeeld in vroege diarree en late diarree.
Vroege diarree is de diarree die optreedt binnen 24 uur na toediening van de chemokuur. Neem contact op met uw behandelend arts of met de oncologieverpleegkundige indien dit optreedt, zij zullen u adviseren over een passende behandeling.
Late diarree begint meer dan 24 uur na toediening van de chemokuur (gemiddeld begint de late diarree 5 dagen na toediening). Zodra er late diarree optreedt neemt u contact op met uw behandelend arts of de oncologieverpleegkundige, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon. Een bijwerking van de behandeling van diarree is namelijk obstipatie (verstopping).
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 2 a 3 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint vaak met een pijnlijke hoofdhuid. In enkele gevallen kan de haaruitval acuut optreden. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- In verband met de mogelijke bijwerkingen moet u na de 1^{ste} en 2^{de} kuur nog een uur nablijven. Tevens wordt tijdens deze toediening de bloeddruk gecontroleerd. Het is niet aan te raden zelf naar huis te rijden in verband met mogelijke duizeligheid en wazig zien.

Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- U krijgt voor de chemokuur medicatie in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend om bijwerkingen tegen te gaan.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.