

Het verloop van de Pemetrexed kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1. Pemetrexed (=Alimta)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
P																					

Wijze van toedienen, waar en hoe vaak?

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De totale behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Rondom deze kuur zijn geen speciale maatregelen nodig wat betreft de uitscheidingsproducten zoals, urine, ontlasting, sperma, speeksel of braaksel.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie krijgt u een vitamine B12 injectie, dit wordt om de 9 weken herhaald zolang u aan het kuren bent. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie gaat u starten met foliumzuur, elke ochtend 1 tablet. Hier gaat u mee door tot en met 3 weken na de laatste chemokuur. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt