

## Het verloop van de R-CVP/COP kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **R**ituximab
2. **C**yclofosfamide
3. **O**ncovin (=Vincristine)
4. **P**rednison

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R																				
C																				
O																				
P	P	P	P	P																

### Wijze van toediening:

Rituximab, Oncovin en Cyclofosfamide worden u toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de oncologiepoli van de ZGT. De toediening duurt ongeveer 3,5 uur. De 1<sup>e</sup> en de 2<sup>e</sup> kuur duren langer aangezien de Rituximab dan langzamer inloopt. De Prednison kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U begint hiermee op de ochtend van de chemokuur en slikt dit elke kuur 5 dagen achter elkaar. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de chemokuur veel drinkt (1,5 tot 2 liter).
- Door Oncovin is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Door prednison kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag 7 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

**De bijwerkingen van de Rituximab staan beschreven in de bijgeleverde folder.**

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.