

Longfunctieafdeling: Tredmolenonderzoek

Doel

Met dit onderzoek wordt vastgesteld of u inspanningsastma heeft.

Vorbereiding

- **Stoppen met medicatie**
Als u longmedicatie of tabletten tegen allergie gebruikt dient u deze voor het onderzoek te stoppen. **(Zie folder longmedicatie)**
- Verricht geen zware inspanning op de dag van het onderzoek.

Het onderzoek

Eerst wordt uw longfunctie gemeten. U krijgt een klem op uw neus en ademt via een mondstuk dat is verbonden met een apparaat. U wordt gevraagd een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.

Daarna gaat u circa zes minuten hardlopen op een loopband met een helling. Tijdens de test wordt uw hartslag gemeten.

Na het hardlopen wordt de longfunctie een aantal keren gemeten om de reactie op de inspanning te bepalen. Als u benauwd wordt van de inspanning krijgt u medicatie om de reactie op te heffen.

Complicaties en bijwerkingen

U kunt een late reactie krijgen op het onderzoek. Als u een aantal uren na de test benauwdheidsklachten krijgt, kunt u de longmedicatie gebruiken die uw arts u heeft voorgeschreven. Indien u geen longmedicatie gebruikt, kunt u contact opnemen met het secretariaat longgeneeskunde.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 45 minuten.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u bellen met het secretariaat longgeneeskunde.

Locatie en route

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het secretariaat longgeneeskunde:

- Ziekenhuislocatie Almelo, route 0.3. Telefoonnummer 088 708 33 00.
- Ziekenhuislocatie Hengelo, route 0.9. Telefoonnummer 088 708 33 00.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt