

Anorectale manometrie

Klachten over de stoelgang zoals obstipatie of incontinentie kunnen samenhangen met een gestoorde functie van anus of rectum (endeldarm). Wanneer u één van deze klachten heeft, kan het zinvol zijn om een drukmeting te verrichten.

Procedure

Uw behandelend arts heeft voor u een afspraak gemaakt voor een anorectaal functieonderzoek. Het onderzoek geeft informatie over het functioneren van de endeldarm en de anale sluitspier. Het onderzoek bestaat uit een aantal testen. Deze testen worden gedaan om na te gaan of er verband is tussen uw klachten en eventuele afwijkingen in de functie van de endeldarm (laatste stukje van de darm) en/of kringspier (anus).

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt twintig tot dertig minuten.

Vorbereiding

Voor het onderzoek dient u te proberen ontlasting kwijt te raken en te urineren, zodat blaas en endeldarm leeg zijn. Als het nodig is, wordt de endeldarm vooraf gereinigd met een klysma. Het onderzoek vindt plaats op het MDL centrum (routenummer 1.4). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de arts-onderzoeker en/of een endoscopieverpleegkundige.

Vorbereiding op de functieafdeling

U wordt verzocht alleen uw onderkleding uit te trekken en op uw linkerzijde met opgetrokken knieën op de onderzoekstafel plaats te nemen.

Manometrie

Tijdens het onderzoek ligt u stil en ontspannen op een onderzoeksbank. Allereerst wordt er een anorectale manometrie uitgevoerd. Dit is een meting waarbij de druk in de kringspier en in het

laatste stukje van de darm wordt geregistreerd.

Er wordt een dun slangetje met daaraan een ballonnetje via de anus ingebracht. Aan het andere uiteinde is dit slangetje verbonden aan meetapparatuur. Het inbrengen kan kortdurend vervelend zijn. Vervolgens vraagt de onderzoeker of verpleegkundige om een aantal opdrachten te doen, zoals knijpen met de anus, persen en hoesten.

Capaciteitsmeting

Na de manometrie wordt een capaciteitsmeting uitgevoerd. Met deze test wordt gekeken of de endeldarm een normale functie heeft. Het ballonnetje wordt met kleine beetjes tegelijk opgeblazen. Wij vragen u om aan te geven wanneer u merkt dat er zich iets vult in de darm. Hierna wordt het ballonnetje nog wat verder opgeblazen tot u aangeeft dat u naar het toilet zou kunnen. Tot slot wordt het ballonnetje opgeblazen tot u aangeeft dat u echt heel nodig naar het toilet moet. Hierna wordt het ballonnetje direct weer geleegd en wordt het slangetje verwijderd.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u niet opgenomen bent, kunt u zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door een maag-darm-lever arts. Uw behandelend arts geeft u de uitslag van het onderzoek.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Complicaties

Het onderzoek is niet pijnlijk. Veel patiënten vinden het onderzoek wel gênant. Natuurlijk zal het onderzoek zo discreet mogelijk plaatsvinden. Bij een drukmeting van anus en rectum komen zelden of nooit complicaties voor.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Bent u verhinderd op uw afspraak te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het MDL-Centrum, telefoonnummer 088 708 7070.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met het MDL-Centrum telefoonnummer 088 708 7070.