

Druppelinstructie tobradex Rondom de strabismusoperatie

Inleiding

Binnenkort wordt u of uw kind geopereerd aan de ogen i.v.m. scheelzien. Hierbij treft u de druppelhandleiding aan van de tobradex oogdruppels, waarvan u zojuist een recept heeft meegekregen. Deze druppel is ontstekingsremmend en zorgt er dus mede voor dat het risico op een oogontsteking zo klein mogelijk is.

Hoe gebruikt u tobradex oogdruppels?

De dag voor de operatie drie keer per dag een druppel in het te opereren oog/de te opereren ogen.

's Avonds na de operatie een druppel in het geopereerde oog/de geopereerde ogen.

De vijf dagen na de operatie drie keer per dag een druppel in het geopereerde oog/de geopereerde ogen.

Hoe kan het beste worden gedruppeld?

- Was uw handen;
- Zet het geopende flesje oogdruppels klaar;
- Uw kind kan het beste op de rug gaan liggen;
- Met duim en wijsvinger van één hand houdt u de oogleden van het oog open;
- U neemt vervolgens het geopende flesje in uw andere hand;
- U laat één druppel onder in het geopende oog vallen, op het witte gedeelte;
- Vervolgens laat u het ooglid los en kunt u het gesloten oog af vegen;
- Op dezelfde manier druppelt u het andere oog;
- Indien u twijfelt of de druppel er wel in is gekomen, graag nogmaals druppelen;
- Was na het druppelen uw handen!

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan wil de orthoptist of oogarts deze graag beantwoorden. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088-7083140.