

Het verloop van de Paclitaxel /Carboplatin kuur (in combinatie met radiotherapie)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Paclitaxel (=Taxol)
2. Carboplatin

1	2	3	4	5	6	7
P						
C						

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De totale toediening duurt ongeveer 3 uur. De eerste kuur duurt langer aangezien de Paclitaxel dan langzamer moet inlopen. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 7 dagen gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal 4 keer daags 1000 mg Paracetamol innemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Het komt af en toe voor dat iemand, ondanks vooraf toegediende medicatie via het infuus, allergisch reageert op deze kuur (tijdens toediening).
- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt