

Het verloop van de Paclitaxel /Bevacizumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Paclitaxel (=Taxol)**
2. **Bevacizumab**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
P							P							P													
B														B													

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

Om een allergische reactie op de Paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

De totale behandeling duurt ongeveer 2 uur, maar op de dagen van de Bevacizumab langer. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen 3x wekelijks gegeven, gevolgd door een week rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 3 a 6 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door de Bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Voorafgaande en aan het einde van de Bevacizumab wordt daarom de bloeddruk gemeten.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen 2 tot 3 dagen na het infuus optreedt. U mag hiervoor zonodig maximaal 4x daags 1000 mg Paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag 3 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van de Bevacizumab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.