

Het verloop van de MVAC kuur (2 wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen

1. **M**ethotrexaat
2. **V**inblastine
3. **A**driamycine (= Doxorubicine)
4. **C**isplatin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M	V A C												

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie en de verpleegafdeling oncologie van de ZGT.

De Methotrexaat wordt u toegediend op dag 1. Op dag 2 krijgt u de Vinblastine, Adriamycine en Cisplatin toegediend. U wordt tussen dag 2 en 3 één nacht opgenomen voor het toedienen van extra vocht.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 2 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 3 a 6 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw arts.
- Door Adriamycine, is tot enkele dagen na de kuur rood verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na toediening niet te dragen.
- Om de schadelijke werking van cytostatica op uw nieren te verminderen krijgt u tijdens de behandeling extra vocht toegediend. Daarvoor dient u één nacht opgenomen te blijven.
- U kunt vocht gaan vasthouden en daardoor in gewicht toenemen.
- Door Vinblastine is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag 8 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen