

Het verloop van de FLOT kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. Fluorouracil (=5FU)
2. Leucovorin (=folinezuur)
3. Oxaliplatin
4. Taxotere (=docetaxel)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F													
L													
O													
T													

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling oncologie van de ZGT. Voor deze chemokuur wordt u één nacht opgenomen. De volgende kuur start in principe twee weken na dag één als de bloedsuitslagen goed zijn.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5°C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- Klachten van spier- en/of gewrichtspijn kunnen voorkomen. U mag hiervoor zo nodig tot maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend specialist.
- Drink zo min mogelijk koude dranken en kleeft u zo warm mogelijk aan.
- Tijdens de toediening van oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel. Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken,

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

vreemd gevoel in de tong

- Resten cytostatica kunnen tot dag zeven in het lichaamsvocht (onder meer in urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.