

## Het verloop van de gemcitabine/NAB-paclitaxel kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **G**emcitabine
2. **N**AB-paclitaxel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<b>N</b>							<b>N</b>							<b>N</b>														
<b>G</b>							<b>G</b>							<b>G</b>														

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De toediening duurt ongeveer 90 minuten.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen drie keer wekelijks gegeven, gevolgd door een week rust.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal drie à zes weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag zo nodig maximaal vier keer daags 1000 mg Paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten cytostatica kunnen tot dag drie in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt