

## Radiotherapie in combinatie met capecitabine

U gaat starten met een behandeltraject. Dit bestaat uit twee onderdelen:

1. Chemotherapie (capecitabine)
2. Bestraling

### Behandeltraject:

- De bestraling vindt gedurende vijf weken plaats van maandag tot en met vrijdag. Bij de afdeling radiotherapie krijgt u hier meer informatie over. De bestraling vindt plaats in het MST te Enschede of het Deventer Ziekenhuis.
- Op de dag van de bestraling start u 's ochtends met het innemen van de capecitabine.
- De capecitabine neemt u gedurende vijf weken (35 dagen) dagelijks in, dus ook op de dagen (weekend) wanneer u geen bestraling krijgt.
- Uw dagdosis capecitabine is:

Twee keer per dag ..... milligram			
Ochtend		Avond	
	500mg tabletten		500mg tabletten
	150mg tabletten		150mg tabletten

### Wijze van inname:

- Neem de capecitabine twee keer per dag in, laat er ongeveer twaalf uur tussen zitten.
- Neem de capecitabine binnen 30 minuten na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water.
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw oncoloog en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan uw oncoloog heeft voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw oncoloog.
- Neem een vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet, maar volg het normale behandelingschema.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

## Bijwerkingen:

### **Neem direct contact op met het ziekenhuis indien één of meer van de volgende symptomen optreden:**

- Koorts boven de 38,5°
- Braken, meer dan één keer in 24 uur
- Bij een toename van 4 of meer keer ontlasting in vergelijking met uw normale ontlastingspatroon of als u 's nachts diarree heeft
- Pijn op de borst, vooral als dit tijdens inspanning optreedt

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- Misselijkheid en verlies van eetlust
- Vermoeidheid
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en 4x per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen
- Hand-voet huidreactie: de handpalmen en voetzolen kunnen rood verkleuren, verschilferen, het ontstaan van kloofjes en een pijnlijk of tintelend gevoel. Het is zinvol uw handen en voeten twee keer per dag in te smeren met een vette crème.

Bij vragen, onduidelijkheden of wanneer u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen

Poli oncologie: 088-7087076 locatie Almelo  
088-7087075 locatie Hengelo

Buiten kantoortijden via afdeling 5 west: 088-7083420