

Infliximab

Uw reumatoloog heeft u infliximab voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Dit is een biologische reumaremmers. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van infliximab

Infliximab wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew/axiale spondyloartritis. Infliximab kan de oorzaak van uw reumatische aandoening niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. In het bloed van ieder mens zit de stof TNF-alfa. Deze stof helpt het lichaam bij het bestrijden van infecties, maar het heeft ook een belangrijke rol bij reumatische aandoeningen. Reumapatiënten maken vaak teveel TNF-alfa aan. Deze ongewenste overproductie van TNF-alfa zorgt voor een chronische ontsteking van onder andere gewrichten. Infliximab zorgt ervoor dat TNF-alfa geblokkeerd en minder actief wordt. Daardoor verminderen de ontstekingen en kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten na enige tijd afnemen. Ook heeft het een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. Het kan enkele weken duren voordat u merkt dat infliximab begint te werken. Een nadeel is dat uw afweersysteem geremd wordt waardoor u vatbaarder bent voor infecties.

Mogelijke bijwerkingen infliximab

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend:

- Overgevoelighedsreacties zoals al dan niet jeukende huidafwijkingen, moeilijk ademen, pijn op de borst of lage bloeddruk (treden meestal op bij de eerste of tweede toediening). Om deze verschijnselen te verminderen kan de arts besluiten de snelheid van de toediening te verlagen of bepaalde medicijnen toe te toedienen. Bij

ernstigere verschijnselen wordt de toediening vaak gestopt.

- Milde infecties zoals verkoudheid, griep en blaasontsteking.
- Hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Soms/zelden voorkomend:

- Opvlamming vroegere tuberculose. Daarom worden alle patiënten die beginnen met de behandeling onderzocht op aanwezigheid van (actieve of vroegere) tuberculose.
- Ernstige infecties.
- Verslechtering van de hartfunctie bij patiënten met hartfalen.

Zeer zelden voorkomend:

- Ontstaan van andere auto-immuunziekten.

Wijze van toediening

Infliximab wordt toegediend via een infuus in de arm. Dit duurt ongeveer een halve dag en vindt in ZGT locatie Almelo plaats op de afdeling dagopname (routennummer 1.4) en in ZGT locatie Hengelo op de afdeling kort verblijf (routennummer 1.18). Het infuus blijft na toediening nog een uur zitten, om eventuele overgevoelighedsreacties zo nodig snel te kunnen behandelen. Daarna wordt het infuus verwijderd en kunt u naar huis. Twee en vier weken na het eerste infuus krijgt u opnieuw een toediening. Daarna wordt infliximab elke acht weken toegediend. Als infliximab bij u goed werkt dan kan het voor onbepaalde tijd worden gegeven.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Waarschuwingen

- Voordat u met de medicatie mag starten wordt u eerst onderzocht op tuberculose en hepatitis B.
- Neem voor iedere toediening altijd de "patiëntvragenlijst voor toediening biologicals" door zodat u weet of u infliximab toegediend mag krijgen. Neem minimaal één dag voor de geplande datum van het infuus contact op met de polikliniek indien het infuus om welke reden dan ook afgezegd moet worden.
- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: koorts, koude rillingen, ernstige infectie/ziekte en bijwerkingen.
- Gebruik géén infliximab tijdens het gebruik van antibiotica, koorts of ernstige infectie. Maak eerst de kuur af en wacht totdat de koorts of ernstige infectie weg is en u zich weer goed voelt.

Tandheelkundige ingrepen

Infliximab mag u meestal in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven gebruiken. Bij bloedige ingrepen kan wel geadviseerd worden om antibiotica te gebruiken, om het risico op een infectie te verlagen. Het is daarom verstandig om uw reumatoloog tijdig te informeren dat u een ingreep moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met infliximab.

Geplande operaties

Infliximab mag u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven gebruiken. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of degene die de operatie uitvoert alsnog besluiten om infliximab tijdelijk te staken. Het is verstandig om uw reumatoloog tijdig te informeren dat u een operatie moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met infliximab.

Reizen en vaccinaties (inenting)

- **Griepvaccinatie:** kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens behandeling met infliximab aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening wordt zelfs aanbevolen.
- **Reisvaccinaties:** heeft u een reis naar een (tropisch) land in de planning waarvoor reisvaccinaties nodig zijn (denk aan gebieden als Afrika en Zuid-Amerika) of gaat u naar een land zonder goede medische en hygiënische voorzieningen? In dat geval is het verstandig om uw reumatoloog of reumaverpleegkundige tijdig (zo mogelijk één jaar van te voren) hiervan op de hoogte te stellen. Het reizen naar landen waarvoor toediening van een 'levend verzwakte vaccinatie' vereist is of waar bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC (tuberculose) en gele koorts voorkomen, wordt afgeraden. Tijdens het gebruik van infliximab mag u geen 'levend verzwakte vaccinaties' toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door reumaremmers kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog, reuma-verpleegkundige en/of degene die de vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Neem tijdig contact op (minimaal drie maanden voor u zwanger wilt worden) met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om te overleggen of infliximab invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen), het ongeboren kind, de zwangerschap zelf en borstvoeding. Indien u tijdens het gebruik van infliximab onverwacht zwanger wordt neem dan contact op met uw reumatoloog of huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- www.zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.