

## Stereotactische mammalokalisatie

Tijdens eerder onderzoek is een afwijkende plek in de borst gezien. De chirurg heeft voorgesteld om de verdachte plek te verwijderen. Door middel van een stereotactische mammalokalisatie wordt de juiste plek gemarkeerd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.

### Belangrijk om te weten

- Voor dit onderzoek mag u geen bodylotion, crème of talkpoeder gebruiken op uw borst(en).
- Zwangerschap  
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek melden.

### Medicijnen

Als u bloedverduunners gebruikt, moet u dit melden. Afhankelijk van het soort bloedverdunner kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen. Dit bespreekt de arts met u.

### Verloop van het onderzoek

U ligt op uw buik op de onderzoekstafel. Uw borst wordt in een opening geplaatst en gedurende het hele onderzoek stevig aangedrukt door twee platen. De laborant maakt eerst enkele beelden van uw borst uit verschillende hoeken. Met behulp van deze beelden kan de computer precies bepalen waar de afwijking zich bevindt. Eerst wordt de plaats waar de naald wordt ingebracht gedesinfecteerd. Daarna wordt de verdachte plek aangeprikt. Dit kan even gevoelig zijn. In de naald zit een draadje. Aan het uiteinde dat in de borst komt, zit een klein 'haakje' dat de draad op zijn plaats houdt. De naald wordt uit de borst verwijderd en het andere uiteinde van het draadje steekt uit uw borst. Er worden ter controle nog twee

röntgenfoto's gemaakt.

Als het draadje op de goede plek zit, wordt het vrije uiteinde van het draadje op de huid vastgeplakt. Daarna kunt u terug naar de verpleegunit in afwachting van de biopsie.

Het kan ook zijn dat u rechtstreeks naar de operatiekamer gaat voor de biopsie. Ook is het mogelijk dat u naar de afdeling nucleaire geneeskunde gaat voor een schildwachtklieeronderzoek.

Het is belangrijk dat u probeert uw arm zo min mogelijk te bewegen. Dit om te voorkomen dat het draadje verschuift.

### Biopsie op de operatiekamer

De chirurg verwijdert nu het weefsel rondom het draadje in uw borst. Hiermee wordt de verdachte plek uit uw borst gehaald. Het weggenomen weefsel gaat vervolgens voor onderzoek naar de afdeling pathologie. Binnen een week is de uitslag bekend en bespreekt de chirurg de uitslag met u.

### Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

### Uitslag

De biopten worden naar het pathologisch laboratorium gestuurd voor microscopisch onderzoek.

De uitslag van de biopsie krijgt u van de chirurg op de mammapolikliniek.

### Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)