

Embolisatie van de vena testicularis

Uw behandelend specialist heeft u voor het emboliseren van spataders rondom de balzak verwezen naar de afdeling radiologie.

Voor deze procedure wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is afhankelijk van het onderzoek en behandeling en is vooraf met u besproken. De procedure vindt plaats op het OK complex.

Belangrijk om te weten

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor het onderzoek. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Vorbereiding bij verminderde nierfunctie/ andere risicofactoren

Indien er sprake is van een verminderde nierfunctie, en/of in combinatie met risicofactoren wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de contrastnefropathie polikliniek. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen via de bloedbaan leiden tot een acute vermindering van nierfunctie, ook wel contrastnefropathie genoemd.

Tijdens het polikliniekbezoek wordt uitleg gegeven over de eventuele te nemen voorzorgsmaatregelen. Hieronder valt het afspreken van een spoelschema met infuusvloeistof voor- en na de procedure, eventueel tijdelijk stoppen van specifieke medicijnen en controle van de nierfunctie 3 tot 7 dagen na de procedure.

Dieet

- Tot een ½ uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt gebruiken: 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft de arts u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Wanneer u **NSAID's** gebruikt, dit zijn medicijnen tegen de pijn en ontstekingen zoals **Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen**, dient u deze op de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek niet in te nemen.
- Als u **Plavix** (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix** (clopidogrel) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor het onderzoek te stoppen met **Plavix**.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor het onderzoek te stoppen met **Brilique** (ticagrelor)
- Als u **Sintrom** (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier **3 dagen** voor het onderzoek mee stoppen.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Als u **Marcoumar** (fenprocoumon) gebruikt, dient u hier **7 dagen** voor het onderzoek mee stoppen.
- Als u **Pradaxa** (dabigatran) gebruikt, dient u hier 24uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Xarelto** (rivaroxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Eliquis** (apixaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Lixiana** (Edoxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen indien anders voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom, Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw aanvragend specialist.

Kleding

Aangezien de procedure plaatsvindt op het OK complex is het niet toegestaan om tijdens de procedure een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan. Tijdens en de eerste uren na de procedure heeft u geen ondergoed aan. Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen. Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de procedure wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen. Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de procedure

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten. Het streven is om u anderhalf uur na opname te behandelen echter kan het tijdstip uitlopen ivm spoedpatienten. U wordt in een bed naar het OK complex gebracht. Daar wordt u ontvangen door gespecialiseerde verpleegkundigen. Gedurende het verblijf op het OK complex wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole. U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patientenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure) In de ontvangstruimte van het OK complex wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht. U wordt door interventielaboranten opgehaald, zij zullen u meenemen naar de interventiekamer. Tijdens de procedure bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

De aanprikplaats wordt ontsmet en verdoofd, dit kan even gevoelig zijn.

Tijdens de procedure wordt u toegedekt met steriele lakens.

De interventieradioloog maakt een kleine opening in de huid en prikt de ader aan. Vervolgens brengt hij een werkbuisje in. Door dit werkbuisje worden de katheters en/of materialen ingebracht die hij nodig heeft. Om anders zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt röntgendoorlichting en een contrastmiddel. Na het inspuiten van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen of het gevoel hebben dat u plast, dit gevoel verdwijnt meestal binnen een minuut. Vervolgens worden foto's gemaakt, u krijgt nauwkeurige instructies tijdens het maken van deze foto's.

Aan de hand van de gemaakte foto's bepaald de interventieradioloog de verdere

behandeling. Een niet goed functionerende ader die het bloed van de spatader afvoert, wordt afgesloten doormiddel van coils. Een soort metalen veertjes.

Duur

De duur van het onderzoek is soms moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het onderzoek 60 tot 90 minuten.

Na afloop van het onderzoek

De interventieradioloog verwijdert het werkbuisje en drukt het gaatje met de hand dicht.

Op de afdeling

Na de procedure wordt u door de interventielaborant overgedragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen van de uitslaapkamer. Zij dragen u over aan de verpleegkundigen van de verpleegafdeling. Op de afdeling krijgt u 1 uur platte bedrust. Meestal kunt u enkele uren na de procedure naar huis. Het tijdstip hoort u van de zaalarts. Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u mag herstarten met uw antistollingsmedicatie.

Complicaties

Geen enkel 'invasief' onderzoek is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens of na een embolisatie complicaties optreden.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend bent met overgevoeligheid voor jodium moet u contact opnemen met uw behandelend specialist. Men kan hier rekening mee houden en tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen toedienen.
- Het kan gebeuren dat het gaatje in het bloedvat weer opengaat en een bloeding in de lies optreedt.
- Daarnaast kan na het onderzoek een blauwe plek ontstaan in de lies. Dit is

vervelend, maar het trekt na verloop van tijd vanzelf weg

Controleafspraak

U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor controle na 2 weken op de polikliniek.

Vervoer

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. U mag de dag van ontslag niet fietsen of autorijden.

Instructies voor thuis

De volgende regels worden aanbevolen na uw ontslag

- U kunt zich thuis douchen.
- De wond mag echter niet "verweken". Daarom mag u de eerste vier dagen na de behandeling geen bad nemen en niet gaan zwemmen.
- Verwijder de pleister de volgende dag. Maak de huid schoon met milde zeep en water. Tevens de wond voorzichtig afdrogen.
- Aangepaste activiteiten gedurende 3-4 dagen: niet persen, niet bukken, zo min mogelijk de trap op- en afdgaan. Niet zwaarder tillen dan 5 kilo.

Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger)
- De lies erg gevoelig/pijnlijk is
- Een zwelling in de lies optreedt
- De lies rood verkleurt en erg warm aanvoelt
- U huiduitslag heeft.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat urologie.

088 - 708 33 90

Buiten kantoor tijden kunt u bellen met de spoedeisende hulp post van ZGT.

088 - 708 39 00

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 telefonisch bereikbaar via secretariaat urologie. 088 - 708 33 90