

Het verloop van de Bendamustine / Obinutuzumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **B**endamustine
2. **O**binutuzumab

Kuur 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
O	B						O							O													

Kuur 2 en verder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
O	B																										

Wijze van toediening:

Obinutuzumab en Bendamustine worden u toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie in ZGT. De toediening op dag één duurt ongeveer vier en een half uur, en op dag twee één uur. De eerste kuur duurt langer aangezien de Obinutuzumab dan langzamer inloopt en verspreid is over meerdere dagen. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de vier weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar valt in principe niet uit, mogelijk kan het wel wat dunner worden. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- De toediening van Obinutuzumab kan een allergische reactie uitlokken. De kans hierop is het grootst bij de eerste toediening en neemt daarna snel af. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen krijgt u extra medicijnen toegediend. Ook is de toedieningssnelheid van de eerste kuur langzamer.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Door de behandeling kunt u last krijgen van uw darmen, en kan diarree optreden. Bij een toename van vier of meer keer ontlasting in vergelijking met uw normale ontlastingspatroon of als u 's nachts diarree heeft, neem dan contact met ons op.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag zo nodig maximaal vier maal daags 1000 mg Paracetamol innemen.
- Resten cytostatica kunnen tot dag vier in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.