

BCG blaasspoeling ZGT, locatie Almelo

Vorbereiding blaasspoelingen

De blaasspoeling met BCG vindt plaats op de polikliniek urologie. Zorg dat u op de afgesproken datum en tijd aanwezig bent.

Voor de eerste blaasspoeling krijgt u uitleg van een (oncologie) verpleegkundige. Drink vier uren voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk. Indien u plastabletten gebruikt moet u deze pas weer na de behandeling innemen.

Voor elke volgende blaasspoeling wordt u gevraagd naar mogelijke bijwerkingen of bijzonderheden na de laatste blaasspoeling.

Voor het al dan niet kunnen vaststellen van een infectie wordt voorafgaand aan iedere blaasspoeling uw urine onderzocht op ontstekingscellen. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie. Voor het onderzoek moet dit verse urine zijn. Het urinemonster moet dus in het ziekenhuis worden opgevangen. U wordt door de oncologieverpleegkundige hierover geïnstrueerd.

Uitvoering van de blaasspoeling

Voor de blaasspoeling brengt de verpleegkundige van de polikliniek urologie een katheter via de plasbuis in de blaas. Hierna wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht, waarna de katheter verwijderd wordt.

Nazorg

Om het medicijn zo goed mogelijk te laten inwerken, moet u proberen het medicijn twee uur in de blaas te houden. Alleen indien u dit niet kunt volhouden mag u na 1 uur uitplassen. De eerste twee uur na de toediening van de blaasspoeling mag u niets

drinken. Na de eerste poliklinische blaasspoeling plast u uit in het ziekenhuis op een door een verpleegkundige aangewezen toilet. Als het uitplassen geen problemen oplevert mag u de volgende keren direct na de toediening van de blaasspoeling naar huis en plast u thuis uit op het toilet.

Mannen kunnen het beste zittend plassen. Dit is noodzakelijk om verspreiding van bacteriën te voorkomen. Als voorzorgsmaatregel en uit veiligheidsoogpunt moet u een scheut chloor in het toilet gieten, pas daarna spoelt u het toilet door met een gesloten deksel. Herhaal dit iedere keer tot zes uur na het begin van de behandeling. Het toilet is, als deze instructies worden opgevolgd, direct weer bruikbaar voor uw huisgenoten. Indien er twee toiletten beschikbaar zijn kunt u voor de eerste zes uur kiezen voor een eigen toilet, maar dit is niet noodzakelijk.

Zorg er verder voor dat u na iedere toiletgebruik zorgvuldig uw handen wast.

Probeert u gedurende 48 uur extra veel te drinken 1,5 -2 liter per 24 uur om uw blaas goed schoon te spoelen. Sommige patiënten ervaren na de behandeling een branderig gevoel tijdens het plassen. Ook dit kan verminderd worden door veel te drinken.

Vermijd huidcontact met de uitgeplaste vloeistof, indien dit toch gebeurt moet u de huid schoonmaken met verdunde chloor.

Het toilet dient de eerste week dagelijks te worden schoongemaakt met chloor. Indien u tijdens het urineren urine buiten het toilet most moet u de omgeving reinigen met chloor.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Geslachtsgemeenschap

Wij adviseren om de eerste week na de spoeling bij geslachtsgemeenschap een condoom te gebruiken.

Contact opnemen

Bij de volgende klachten is het belangrijk contact op te nemen met uw behandelend uroloog of buiten kantoor tijden met de afdeling spoedeisende hulp.

- Koorts (boven de 38.5°C) of koude rillingen.
- Hoesten.
- Bloed bij de urine.

Op werkdagen tijdens kantooruren:

Polikliniek urologie;
Telefoonnummer 088 708 33 90.

Buiten kantooruren

Afdeling spoedeisende hulp
Telefoonnummer 088 708 78 78

Belangrijk is nog te vermelden dat als de afspraken voor de controle cystoscopie afgezegd wordt u moet aangeven dat u met deze behandeling bezig bent. De controle cystoscopie moet namelijk wel in de afgesproken week gedaan worden zodat met de vervolgbehandeling op het juiste moment kan worden gestart.

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie.