

Ooroperatie bij kinderen

In overleg met de KNO-arts (keel-, neus- en oorarts) wordt uw kind binnenkort geopereerd aan zijn of haar oor. Met deze ingreep kan een defect aan de gehoorbeentaken en/of een gaatje in het trommelvlies worden hersteld. Herstel van het trommelvlies en/of de gehoorbeentaken verbetert het gehoor van uw kind. Ook een chronische ontsteking in het oor van uw kind kan met deze ingreep, eventueel tegelijkertijd, worden behandeld. De kans dat de klachten van uw kind na de operatie verdwenen of verminderd zijn, hangt sterk af van de oorzaak. De KNO-arts maakt per situatie een inschatting van die kans. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en adviezen en leefregels voor thuis.

Vorbereiding op de operatie

De secretaresse van poli KNO maakt met u een afspraak over de opnamedatum en tijd.
Hoe bereidt u uw kind voor?

Een operatie en een opname zijn ingrijpende gebeurtenissen voor een kind. Een goede voorbereiding helpt bij de verwerking ervan. Daarom is het belangrijk dat u uw kind eerlijk vertelt wat het kan verwachten. Voor een peuter/kleuter is een korte eenvoudige uitleg in het algemeen voldoende. Een schoolkind of tiener wil meestal precies weten wat de reden is van de opname en wat de operatie inhoudt.

Polikliniek opnameplanning en anesthesie

Als voorbereiding op de operatie wordt uw kind op de polikliniek opnameplanning en anesthesie onderzocht. Hier wordt uw kind ook voorbereid op de operatie. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt ook de pijnmedicatie afgesproken en krijgt u een recept en een folder 'Paracetamol kinderen' en 'anesthesie kinderen' mee.

Vorbereidingen thuis

- Geef uw kind volgens voorschrift van de preoperatieve screening de eerste paracetamol zetpil;
- Indien uw kind lang haar heeft, is het verstandig hier een staartje van te maken. Gebruik geen elastiek met metalen verbindingstukje;
- Douche uw kind;

- Trek uw kind schone, gemakkelijk zittende kleding aan.

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze toe zoals met u is afgesproken bij uw bezoek aan de preoperatieve screening.

Wat neemt u mee?

- Eventueel ID kaart van uw kind;
- Eigen beker of drinkfles;
- Schoon T-shirt;
- Extra ondergoed of luier;
- Eventueel eigen (dieet)voeding;
- Knuffel of speelgoed;
- Eventuele eigen medicijnen.

Eventuele nagellak verwijderen en sieraden bij voorkeur thuislaten.

Wij verzoeken u geen broertjes of zusjes mee te nemen op de dag van de operatie.

Wij verzoeken u contact op te nemen met de polikliniek KNO als uw kind:

- Koorts heeft of ziek is;
- In contact is geweest met iemand met een besmettelijke kinderziekte

De operatie

Wanneer uw kind aan de beurt is voor de operatie wordt u begeleid naar de operatiekamer. Bij het in slaap brengen van uw kind door de anesthesie mag één ouder

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

aanwezig zijn, in speciale kleding. Bij zwangerschap tot dertien weken mag de moeder niet mee.

Het in slaap brengen van uw kind gebeurt met een kapje als het jonger is dan vier jaar. Oudere kinderen mogen kiezen, maar krijgen over het algemeen een prikje, tenzij dit anders met u is afgesproken. Is dit het geval krijgt u een recept mee voor verdovende zalf. Tijdens de operatie wordt het oor opengemaakt via een snede achter de oorschelp. Vaak wordt ook een gedeelte van het schedelbot achter het middenoor geopend. De operatie wordt uitgevoerd met behulp van een operatie microscoop. Hierdoor kan de arts heel nauwkeurig werken.

Na de operatie

Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. U mag dan meteen naar uw kind toe. Bij uw kind is een groot drukverband of een oorlap aangelegd. Hieronder bevindt zich in het oor een tampon die het wondvocht opvangt. Uw kind heeft ook een infuus gekregen. Als uw kind goed wakker is, gaat u samen met uw kind en een verpleegkundige terug naar de kinderafdeling.

Bijwerkingen van de operatie

Uw kind kan misselijk zijn door de narcose en van de operatie zelf als het evenwichtsorgaan betrokken is geweest bij de ontsteking. Via het infuus kunnen hiervoor medicijnen gegeven worden. Bij pijn rond of in het oor krijgt uw kind een zetpil. Het kan zijn dat uw kind duizelig is, dit is meestal van voorbijgaande aard.

Pijnbestrijding

Voor goed herstel is het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft. Dit zal de verpleegkundige meten met behulp van pijnmeetinstrumenten. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat uw kind veel pijn krijgt. Als uw kind pijn heeft, is het belangrijk dit aan de verpleegkundige te melden, zodat deze de benodigde pijnstillers kan geven.

Naar huis

Afhankelijk van de operatie wordt afgesproken wanneer, indien aanwezig, het drukverband eraf mag en wanneer de arts de tampon verwijdert. Als uw kind goed drinkt en niet misselijk is, wordt het infuus de avond na de operatie verwijderd.

De arts spreekt af wanneer uw kind naar huis mag. Soms is dit dezelfde dag, maar meestal de dag na de operatie. Ook wordt er voor uw kind een controleafspraak gemaakt op de polikliniek na ongeveer een week. Tijdens de controleafspraak verwijdert de KNO-arts de hechtingen.

Herstel thuis

Voor goed herstel moet uw kind zich, tót de controleafspraak op de polikliniek met de KNO-arts, houden aan de volgende leefregels:

- Niet de neus snuiten, wel afvegen;
- Niet bukken of zwaar tillen om te voorkomen dat er teveel druk op het oor komt;
- Niet niezen met gesloten mond;
- Niet sporten, tijdens de controle geeft de KNO-arts aan wanneer uw kind weer mag sporten;
- Na één tot twee dagen weer naar buiten;
- Na een week weer naar school, eventueel eerst halve dagen;
- Thuis pijnstillers gebruiken zoals aangegeven in de folder 'Paracetamol kinderen'.

Let op! Het oor van uw kind mag niet nat worden. Haren wassen mag daarom alleen met hulp van een ouder. Een drinkglas over het oor zorgt ervoor dat er geen water bij kan komen.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie, ook een ooperatie, is er sprake van enig risico. Maar complicaties bij een ooperatie zijn zeldzaam omdat via een operatiemicroscoop heel nauwkeurig kan worden gewerkt. Een enkele keer raakt het evenwichtsorgaan beschadigd tijdens de operatie. Uw kind kan hierdoor last hebben

van duizeligheid. Ook kan de aangezichtsenuw beschadigd raken. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar maanden. Door het middenoor loopt een dunne zenuw die van belang is voor de smaak van de betrokken tonghelft. Een enkele keer moet deze zenuw worden doorgesneden bij een ooroperatie. Uw kind merkt dit doordat de smaak vermindert of verandert. De smaak herstelt zich echter vaak weer vanzelf.

Contact of vragen

Bij problemen binnen 24 uur na de operatie kunt u op onderstaande wijze contact opnemen.

Polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde

Telefoonnummer 088 708 33 50
(tijdens kantooruren).

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 088 708 78 78
(buiten kantooruren).

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw behandelend specialist aan u kenbaar gemaakt worden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek keel-,neus- en oorheelkunde.