

Het verloop van de Rituximab / Bendamustine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **R**ituximab
2. **B**endamustine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
R	B																											

Wijze van toediening:

Rituximab en Bendamustine worden u toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de oncologiepoli van de ZGT. De toediening duurt ongeveer 3,5 uur. De 1^e en de 2^e kuur duren langer aangezien de Rituximab dan langzamer inloopt. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 4 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 4 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van de Rituximab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjBP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo