

Pacemaker implantatie

Uw cardioloog heeft met u besproken dat een pacemaker een oplossing kan bieden om uw hartklachten te verhelpen. In deze folder kunt u meer informatie vinden over de pacemaker implantatie.

Voor de implantatie

Na het gesprek met uw cardioloog wordt de procedure in gang gezet. In de week voor de implantatie krijgt u bericht wanneer u wordt wanneer u wordt opgenomen voor de pacemakerimplantatie.

Daarnaast worden er afspraken met u gemaakt over eventuele andere onderzoeken die nog gedaan moeten worden. Op de opnamedag meldt u zich op de afgesproken locatie (Almelo/Hengelo).

Belangrijk

Het gebruik en staken van eventuele bloedverdunders wordt tijdens bovengenoemd gesprek met u besproken. (Er is veel verschil in bloedverdunders en termijn van stoppen). De ochtend van de operatie mag u een licht ontbijt nemen en uw medicijnen innemen. Wordt u in de middag geholpen dan mag u normaal ontbijten.

De implantatie

Voor de implantatie krijgt u op de verpleegafdeling een infuusnaald in uw arm, dit om antibiotica en eventueel andere medicatie toe te kunnen dienen.

De pacemaker implantatie vindt plaats op een röntgenkamer in verband met het gebruik van röntgen straling tijdens de implantatie. De medewerkers dragen daarom beschermende kleding. Op de röntgenkamer wordt u aangesloten aan een monitor om uw hartslag te kunnen bewaken tijdens de operatie.

De implantatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Meestal wordt de pacemaker links onder het sleutelbeen geplaatst. Er wordt onder de huid (tussen huid en borstspier) een holte (pocket) gemaakt en er wordt een bloedvat aangeprikt waardoor de draden naar

het hart opgevoerd worden. Onder röntgen doorlichting worden de draden op de goede plek in het hart gelegd.

Vervolgens wordt door de pacemakertehnicus een aantal testen uitgevoerd om te beoordelen of de pacemaker draden goed werken. Tijdens deze metingen kunt u wat hartkloppingen voelen (deze zijn ongevaarlijk).

Wanneer alle testen goed zijn worden de pacemakerdraden vast gehecht en aangesloten aan de pacemaker.

Vervolgens wordt de pacemaker onder de huid geplaatst en wordt de wond gehecht.

Uitzondering

Indien u linkshandig bent kan de pacemaker rechts geplaatst worden. Ook kan het zijn dat er een medische indicatie is om de pacemaker rechts te plaatsen.

Duur van de ingreep

Wanneer alles vlot verloopt duurt de ingreep ongeveer 1 tot 1,5 uur. Om medische of technische redenen kan het soms langer duren.

Na de operatie

Na de implantatie heeft u 4 uur bedrust. Daarna mag u voorzichtig mobiliseren (bewegen), waarbij u uw arm aan de kant van de implantatie niet mag gebruiken. Om dit te voorkomen krijgt u een mitella om. De dag na de implantatie wordt er een röntgenfoto gemaakt om de ligging van de pacemaker draden en eventuele long beschadiging te beoordelen. Tevens komt de pacemakertehnicus de pacemaker doormeten om te beoordelen of alles goed functioneert. Indien nodig wordt de pacemaker bijgesteld. Tot die tijd wordt u

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

bewaakt met een mobiel bewaking systeem (telemetrie) Dit systeem is verbonden met de bewakingsmonitoren van de hartbewaking.

Belangrijk

Het is van belang dat u uw arm aan de kant van de implantatie ontziet. U mag zich met deze arm niet optrekken of opdrukken. Ook mag u de arm niet boven uw hoofd strekken. Bovenstaande gedurende 4-6 weken.

Naar huis

De dag na de implantatie mag u, indien er geen bijzonderheden zijn, naar huis. U dient zelf vervoer naar huis te regelen. U mag zelf geen autorijden.

Nazorg

U krijgt bij ontslag een afspraak mee voor controle van de operatie wond, tevens wordt dan ook de pacemaker functie gecontroleerd. Dit zal na ongeveer 1 week zijn. Ongeveer 6-8 weken later komt u voor een poliklinische pacemaker controle en bij uw cardioloog. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd.

Verschijnselen na de implantatie

De wond kan nadien wat gevoelig zijn, hiervoor mag u zo nodig pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol) Ook kan de wond wat rood zijn. Dit verdwijnt na verloop van tijd. Bij koorts of koude rillingen moet U zo snel mogelijk contact opnemen met uw huisarts. Deze zal u indien nodig doorverwijzen.

Na controle

Pacemakers jonger dan 5 jaar worden 1 keer per jaar gecontroleerd, daarna wordt een pacemaker elk half jaar gecontroleerd. Hierbij worden de gegevens uit de pacemaker uitgelezen en worden er een aantal testen gedaan. Indien nodig kan de pacemaker dan bijgesteld worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met uw behandelend cardioloog of met de hartstimulatie specialist. Ziekenhuislocatie Almelo 088 708 35 00, ziekenhuislocatie Hengelo 088 708 52 88.

Tevens verwijzen we naar het pacemaker informatie boekje en of website van de hartstichting (www.hartstichting.nl).