

Trigeminusbehandeling

Wat is een trigeminusbehandeling

Een behandeling van de trigeminuszenuw wordt toegepast bij aangezichtspijnen. Met een trigeminusbehandeling kan in de meeste gevallen de pijn sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

Voor de behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wanneer u vroeg aan de beurt bent mag u een licht ontbijt (kopje thee met een beschuit).

Bent u later aan de beurt, dan mag u normaal eten.

Wat voor u van toepassing is, bespreken we met u wanneer we de afspraak maken.

Belangrijk om te melden

Neemt u altijd vóór de behandeling contact op met de polikliniek voor pijnbestrijding, als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnbehandelaar. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

- gebruik van bloedverdünnende medicijnen (bijvoorbeeld. Sintrom, Ascal, Marcoumar, Acetylsalicylzuur, Plavix etc.) De assistente van de polikliniek voor pijnbestrijding zal met u afspreken wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
- Suikerziekte
- Overgevoeligheid voor jodium, medicijnen, contrastvloeistof of pleisters.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de hoofdingang in het ZGT Hengelo. Van daaruit gaat u naar verpleegunit dagbehandeling. De behandeling vindt plaats in een speciale behandelkamer op de operatieafdeling. In de behandelkamer zijn naast de behandelend arts ook nog één of twee

verpleegkundigen en een röntgenlaborant aanwezig.

De verpleegkundige helpt u in de juiste houding voor de behandeling.

De arts zal de huid verdoven en vervolgens de juiste plaats voor de behandeling bepalen. Indien de naaldpunt op de juiste plaats staat, wordt het medicijn ingespoten.

Duur van de behandeling

De gehele behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar dagbehandeling.

Complicaties

- De kans op een hersenvliesontsteking is uitermate gering. Af en toe treedt er een blauwe plek op de wang op. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat er een geringe kans op deze complicatie.
- Mogelijk een doof gevoel in het deel van het gezicht, waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook kan er een doof gevoel in het hoornvlies van het betreffende oog ontstaan. Deze klachten trekken vanzelf weg.
- Soms kan een brandende napijn ontstaan en soms kan de oorspronkelijke pijn tot circa twee weken na de behandeling blijven bestaan.

Vervoer

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend, mag u de eerste 24 uur niet zelfstandig een auto besturen. Ook fietsen is om dezelfde reden niet toegestaan. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

optreden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling nodig.

Let op !

De anticonceptiepil is tot de eerst volgende menstruatie niet meer betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de assistente van de polikliniek voor pijnbestrijding. Zij is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 en 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 088 708 50 80.