

Lipsluiting bij schisis (3-6 maanden)

Uw kind is geboren met een lip- en/of een gehemeltaspleet. Om de lip- en gehemeltaspleet te sluiten, zijn verschillende operaties nodig. Bij deze eerste operatie wordt de lip gesloten. In deze folder krijgt u informatie over de praktische zaken rond de operatie.

Preoperatieve screening

De secretaresse van de polikliniek maakt met u een afspraak over de opnamedatum en tijd. Voorafgaand aan de operatie brengt u met uw kind een bezoek aan de afdeling preoperatieve screening. Daar krijgt u instructies over het nuchter zijn op de dag van de operatie, de wijze van anesthesie en instructies over eventueel medicatie gebruik. Zie de folder 'Anesthesie kinderen'. Ook krijgt u de folder 'Paracetamol kinderen' mee voor pijnbestrijding. Hierin wordt aangegeven wanneer en welke pijnstillers u moet geven.

Vorbereidingen thuis

- Geef volgens afspraak de laatste voeding;
- Geef uw kind volgens afspraak de eerste paracetamol zetpil;
- Wilt u uw kind in bad doen;
- Wilt u uw kind schone, gemakkelijk zittende kleding aandoen.

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze toe zoals met u afgesproken is bij de preoperatieve screening.

Wilt u de volgende zaken meenemen?

- Eigen beker of drinkfles;
- Schoon T-shirt;
- Extra luier;
- Eventueel eigen (dieet)voeding;
- Knuffel of speelgoed;
- Eventuele eigen medicijnen.

Wij verzoeken u op de dag van de operatie geen broertjes of zusjes mee te nemen.

Wij vragen u dringend om contact op te nemen met de polikliniek plastische chirurgie als uw kind:

- Koorts heeft of ziek is;
- In contact is geweest met iemand met een besmettelijke kinderziekte;
- Onlangs gevaccineerd is.

Veiligheid

ZGT ziet veiligheid als basisvereiste voor goede zorg en dienstverlening. Alle patiënten kunnen er op vertrouwen dat zij veilige en goede zorg ontvangen. Van een aantal zaken merkt u niets, maar van andere wel. Zo wordt er gewerkt met een 'time-out' procedure. Dit betekent dat er een aantal zaken extra gecontroleerd worden. Verschillende mensen controleren meerdere keren de naam, geboortedatum van uw kind en voor welke operatie uw kind komt.

De operatie

Wij begeleiden u samen met uw kind naar de operatiekamer. Eén van de ouders/verzorgers mag bij het kind blijven tot het onder narcose is. De plastisch chirurg voert de operatie uit, deze duurt ongeveer 90 minuten.

Na de operatie verblijft uw kind tijdelijk op de uitslaapkamer, één van de ouders mag daar naar toe. Indien de toestand van uw kind stabiel is, haalt de kinderverpleegkundige van de kinderafdeling u en uw kind op. Na de operatie heeft uw kind een infuus en soms spalkjes om de armen. Deze spalkjes voorkomen dat uw kind aan de wond zit, of het infuus er uit trekt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Terug op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling houden wij uw kind in de gaten met een bewakingsmonitor. Uw kind kan onopgemerkt nabloeden. Kinderen hebben de neiging alles door te slikken wat in de mond komt. Om die reden wordt de bloeddruk regelmatig gemeten. Het is van belang dat uw kind op de rug blijft liggen, om te voorkomen dat uw kind met de wond langs het beddengoed schuurt. Over de wond zitten vaak hechtpleisters geplakt. De wond kan er wat naar uitzien door het opgedroogde bloed. Omdat de wond nog niet voldoende genezen is, mag dit nog niet schoongemaakt worden.

Pijnbestrijding

Voor goed herstel is het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft. Wij geven pijnbestrijding via een infuus en met zetpillen. Wij bespreken tijdens het opnamegesprek dat de kinderverpleegkundigen met meetinstrumenten goed bijhouden of en hoeveel pijn uw kind heeft na de operatie. En als u zelf denkt dat uw kind pijn heeft, is het belangrijk dit aan de verpleegkundige te melden zodat hij of zij de benodigde pijnstillers kan geven.

Eten en drinken

Meestal mag uw kind enkele uren na de operatie weer met fles- of borstvoeding beginnen. Als dit niet lukt, geven we sondevoeding. Na het geven van borstvoeding of flesvoeding is het belangrijk de mond na te spoelen met water. U kunt dit doen met een spuitje met water of met een beetje water in de fles. Tijdens de opname komt de mondhygiëniste langs om de mond van uw kind te controleren. Of ze maakt een afspraak met u om uw kind op de polikliniek terug te zien.

Ontslag

De behandelend chirurgen en kinderarts bepalen wanneer uw kind naar huis kan. Meestal is dit een tot drie dagen na de

operatie. De zwelling trekt na enige dagen weg. Het litteken kan nog drie tot twaalf maanden rood blijven zien.

Controleafspraak

U krijgt voor uw kind een controleafspraak bij de chirurgen en de mondhygiëniste voor ongeveer een week na de operatie. Later wordt uw kind op het spreekuur van de Victor Veau Stichting terug gezien.

Richtlijnen voor thuis

Wond

De pleisters kunnen doorgaans na een week worden verwijderd. Dit gebeurt vaak tijdens de poliklinische controle bij de chirurg of de mondhygiëniste.

Pijn

Geef uw kind de voorgeschreven pijnstillers als u denkt dat uw kind pijn heeft.

Voeding

U mag uw kind borstvoeding of flesvoeding geven zoals u gewend bent.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook bij deze operatie is kans op complicaties. Deze zijn niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een nabloeding of een wondinfectie.

Wanneer neemt u contact op

- Als het wondje weer begint te bloeden;
- Als uw kind meer dan 39°C koorts heeft;
- Als uw kind ondanks de pijnstillers pijn lijkt te hebben.

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met:

Ziekenhuislocatie Almelo

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 088 708 52 45.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 088 708 33 80.

Neem buiten kantoortijden contact op met:

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Medisch Spectrum Twente Enschede

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 0541 57 43 80.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 053 487 27 20

Neem buiten kantoortijden contact op met:

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 053 487 20 00.

Victor Veau stichting

Telefoonnummer 06 30 37 73 65

E-mail: secretariaat@schisis-team.nl.

Kijk voor meer informatie ook op:

schisis-team.nl.

Vragen?

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd door uw behandeld specialist aan u kenbaar gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie.