

Dacryoplastiek

U bent door uw arts naar de afdeling radiologie verwezen voor een behandeling van de traanwegen. Na overleg met uw arts heeft U hiermee ingestemd. Het onderzoek/behandeling wordt verricht door een radioloog, geassisteerd door radiodiagnostisch laboranten.

Het doel van het onderzoek is het doorgankelijk maken van de traanwegen met behulp van een ballonnetje (dotteren).

Voor het onderzoek

Het beste kunt u gemakkelijke kleding aantrekken en sieraden zoveel mogelijk thuis laten. Het gebruik van oog make-up is af te raden, omdat het een onderzoek van het oog betreft.

Verloop van het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel.

Het aangedane oog wordt verdoofd door middel van oogdruppels en de binnenkant van de neus met een spray. Vervolgens wordt een dunne plastic draad via de ingang van de traanweg door het traankanaal naar de uitgang van de neus gebracht.

Als deze dunne draad voldoende ver uit de neus steekt, wordt er een katheter overheen geschoven tot in de traanwegen. Aan de punt van de katheter zit een klein ballonnetje, dat in de vernauwing van de traanwegen wordt geschoven en daar wordt opgeblazen. Dit oprekken van zo'n vernauwing met een ballonnetje heet dotteren.

Als de vernauwing gedotterd is, worden de draad en katheter verwijderd.

Uw traanweg wordt doorgespoten met een zoutoplossing. Als laatste wordt er een medicijn in de traanweg gespoten.

U mag het eerste kwartier niet snuiten of opsnuiven.

Na de behandeling krijgt u een recept mee, waarmee u bij uw eigen apotheek oogdruppels (ontstekingsremmers) kunt halen.

U kunt na het onderzoek zelf naar huis rijden.

ONDERSTAAND MEDICIJN GEBRUIK MOET U OPVOLGEN

tenzij uw behandelend arts iets anders heeft voorgeschreven.

- Als u SINTROM of ACENOCOUMAROL gebruikt, dan moet u hier 5 dagen voor het onderzoek mee stoppen
- Als u MARCOUMAR of FENPROCOUMON gebruikt, dan moet u hier 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen.

Waarschuwingen

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.

Patiënten die hierover in onzekerheid verkeren, dienen contact op te nemen met de behandelend arts en de afdeling radiologie. Als u overgevoelig bent voor jodium, contrastvloeistof of last hebt van allergische reacties, wilt u dit dan voor het onderzoek melden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 45 - 60 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar:
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt