

## Het verloop van de Trastuzumab/ Pertuzumab/ Docetaxel kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **T**rastuzumab
2. **P**ertuzumab
3. **D**ocetaxel (=Taxotére)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
T P D																					

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. Bij de eerste toediening duurt in totaal ruim zes uur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de eerste toediening duren de vervolgcuren ruim drie uur. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal vier keer per dag 1000 mg Paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en/of de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

**De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab en Pertuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.**

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen