

Gedeeltelijke verwijdering van de zaadballen

subcapsulaire orchidectomie

In overleg met uw uroloog heeft u besloten tot een gedeeltelijke verwijdering van de zaadballen.

In deze folder leest u over de voorbereiding op deze operatie, de operatie zelf, de nazorg en het ontslag.

Aandoening

Bij een gedeeltelijke verwijdering van de zaadballen verwijderen we het hormoonvormend weefsel uit de beide teelballen. Deze operatie wordt meestal uitgevoerd als hormoonproductie niet meer wenselijk is. Bijvoorbeeld bij een kwaadaardige prostaataandoening.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op de operatie heeft u een afspraak bij de pre-operatieve screening. Hier krijgt u instructies over het nuchter zijn op de dag van de operatie, de wijze van anesthesie (algehele narcose of ruggenprik), en instructies omtrent medicatiegebruik. Wanneer u bloedverdünnende medicatie gebruikt is het van belang om dit te vermelden. Op de operatiedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Vanuit de afdeling brengen wij u naar de voorbereidingskamer.

Operatie

De uroloog maakt een snede in het midden van de balzak en verwijdert het weefsel. Daarna hecht de uroloog de wond. De operatie duurt ongeveer dertig minuten.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u tijdelijk op de uitslaapkamer. Indien uw toestand voldoende stabiel is, haalt de verpleegkundige van de afdeling u op.

U heeft een infuus waarmee vocht en eventueel medicatie kan worden toegediend. Als alles goed gaat kan deze 's avonds weer verwijderd worden.

In de wond zit soms een klein slangetje (drain) om het wondvocht af te voeren.

Nazorg

Na de operatie trekt u de strakke onderbroek of zwembroek aan.

Na de operatie mag u als er geen problemen zijn weer douchen. Wij adviseren u geen zeep te gebruiken in het wondgebied.

Ontslag

Als alles goed verlopen is gaat u de dag na de operatie weer naar huis.

Nazorg thuis

- De eerste week raden we u aan een strakke onderbroek of zwembroek te dragen als steun, ook 's nachts. Dit vermindert de kans op zwelling
- Verder adviseren wij u het rustig aan te doen. Dat betekent niet fietsen, zwemmen, sporten of zwaar tillen
- Niet baden (douchen mag wel)
- Geen geslachtsgemeenschap tot na het eerste polikliniekbezoek.

Controleafspraak

Wij sturen u de uitnodiging voor de controle afspraak naar u thuis op. Zo nodig verwijzen wij u voor verdere behandeling naar een andere specialist.

Eventueel worden de hechtingen verwijderd. Het is ook mogelijk dat hechtingen zijn gebruikt die vanzelf oplossen.

Risico's/complicaties

Naast de algemene complicaties na een operatie als een trombose en een nabloeding,

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

kunnen bij deze operatie ook andere complicaties optreden:

- Bloeduitstorting/zwelling op of bij het scrotum
- Pijn
- Koorts
- Nabloeding
- Zwelling of blauwverkleuring van de balzak gepaard gaande met pijn
- Ontstekingsverschijnselen als een rode of pijnlijke balzak gepaard gaande met koorts.

Wanneer neemt u contact op?

- De eerste week bij koorts (hoger dan 38,5°C) of als u zich ziek voelt
- Als de wond gaat lekken, rood of dik wordt en als er bloed of pus uit de wond komt

Polikliniek urologie

Tijdens kantooruren

- Ziekenhuislocatie Almelo, telefoonnummer 088 708 33 90
- Ziekenhuislocatie Hengelo, telefoonnummer 088 708 52 60.

Spoedeisende hulp

Buiten kantooruren

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Vragen?

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd aan u kenbaar gemaakt door uw behandelend specialist.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie.