

Drainage van de galwegen

Uw behandelend specialist heeft u voor het draineren van de galwegen verwezen naar de afdeling radiologie.

Voor deze procedure wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is vooraf met u besproken.

Bij het draineren van de galwegen wordt via de huid (percutaan) een slangetje (drain) in de galwegen gebracht. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat er geen gal meer via de galwegen naar de dunne darm loopt. Het gevolg daarvan is dat de galproducten in het bloed komen. U kunt hierdoor geel worden en last krijgen van jeuk. Zodra het slangetje in de galweg geplaatst is, kan de gal in het zakje van de drain aflopen en komt het niet meer in uw bloed terecht. Soms is het ook mogelijk een drain te plaatsen die zowel gal afvoert naar buiten als naar de dunne darm. In overleg met behandelend specialist kan op een later tijdstip voor een stent worden gekozen.

Belangrijk om te weten

- Zwangerschap Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.
- Overgevoeligheden Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor het onderzoek.

Dieet

- Tot een 2½ uur voor het melden bij de gastenservice kunt u nog een licht ontbijt gebruiken: 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg;
- 1 kop thee.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft de arts u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Wanneer u **NSAID's** gebruikt, dit zijn medicijnen tegen de pijn en ontstekingen zoals **Diclofenac**, **Ibuprofen** en **Naproxen**, dient u deze op de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek niet in te nemen.
- Als u **Plavix (clopidogrel)** gebruikt dient u hier 7 dagen voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)** gebruikt dient u hier 7 dagen voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Brilique (ticagrelor)** gebruikt dient u hier 7 dagen voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Sintrom (acenocoumarol)** gebruikt, dient u hier 3 dagen voor het onderzoek mee stoppen.
- Als u **Marcoumar (fenprocoumon)** gebruikt, dient u hier 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen.
- Als u **Pradaxa (dabigatran)** gebruikt, dient u hier 48 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Xarelto (rivaroxaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Als u **Eliquis (apixaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Lixiana (Edoxaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor het onderzoek mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen indien anders voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom, Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw aanvragend specialist.

Kleding

Aangezien de procedure plaatsvindt op het OK complex is het niet toegestaan om tijdens de procedure een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan. Tijdens en de eerste uren na de procedure heeft u geen ondergoed aan. Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen. Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de procedure wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen. Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de procedure

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten. Het streven is om u anderhalf uur na opname te behandelen echter kan het tijdstip uitlopen ivm spoedpatienten. U wordt in een bed naar het OK complex gebracht. Daar wordt u ontvangen door gespecialiseerde verpleegkundigen. Gedurende het verblijf op het OK complex

wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patientenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure)

In de ontvangstruimte van het OK complex wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht.

U wordt door interventielaboranten opgehaald, zij zullen u meenemen naar de interventiekamer.

Indien uw aanvragend specialist een roesje noodzakelijk acht, wordt deze verricht door een anesthesiemedewerker.

U wordt door de anesthesiemedewerker op bewakingsapparatuur aangesloten. De anesthesiemedewerker zal u tijdens de procedure door het infuus pijnstillings- en ontspanningsmedicatie toedienen.

De interventieradioloog zal met behulp van echografie uw galwegen in kaart brengen en de positie van de te plaatsen drain bepalen. Aangezien steriel werken bij deze procedure belangrijk is wordt de huid ontsmet en wordt u toegedekt met steriele lakens. Ondanks het roesje zou u het aanpakken kunnen voelen daarom verdooft de interventieradioloog de huid, onderliggend weefsel en het leverkapsel. Met een dunne naald worden de galwegen in de lever aan geprikt. Met behulp van contrastvloeistof worden de galwegen opgespoten zodat ze zichtbaar worden. Zo kan worden gezien waar de afsluiting of vernauwing in de galwegen zit.

Nadat de drain geplaatst is, fixeert de interventielaborant met behulp van een speciale bevestigingspleister de drain op de huid en wordt de insteekopening en bevestigingspleister afgeplakt. Aan de drain wordt een catheterzak bevestigd waarin de gal kan afvloeien.

Als eerder een drain in uw galwegen geplaatst is, kan het zijn dat de interventieradioloog via deze drain een stent plaatst. U heeft dan geen opvangzak meer nodig. De gal wordt

door het plaatsen van een stent via de normale wegen afgevoerd.

Duur

De duur van het onderzoek is soms moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het onderzoek 60 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Na het onderzoek wordt u door de interventielaborant overgedragen aan een gespecialiseerde verpleegkundige van de uitslaapkamer. Zij zullen u overdragen aan de verpleegkundigen van de afdeling. Als u weer op de afdeling bent kunt u, in overleg met de zaalarts, weer normaal eten en drinken. Meestal wordt 2 uur bedrust geadviseerd, daarna kun u weer mobiliseren. De zaalarts zal het verloop van de procedure en de uitslag van de procedure met u bespreken. Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u kunt herstarten met uw antistollingsmedicatie.

Complicaties

Geen enkel 'invasief' onderzoek is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens of na een drainage procedure complicaties optreden.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend bent met overgevoeligheid voor jodium moet u contact opnemen met uw aanvragend specialist. Men kan hier rekening mee houden en tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen toedienen.
- Bloeduitstorting ter plaatse van de insteekopening
- Misselijkheid
- Uitstralende pijn naar de schouderregio
- Gallekkage
- Infectie (sepsis)

Controleafspraak

U krijgt op de verpleegafdeling of van de aanvragend specialist een vervolgspraak mee.

Instructies voor thuis

Op de verpleegafdeling krijgt u instructies voor thuis.

Belangrijk is dat de insteekopening niet mag verweken. Door gebruik van de afdekpleisters kunt u thuis (kortdurend) douchen. Hierover krijgt u op de afdeling meer informatie. Echter is zwemmen en in bad gaan niet toegestaan.

Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger)
- Toename van de pijn
- De drain geen gal meer afvoert

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat interne geneeskunde 088 708 70 81

Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust.

Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via secretariaat interne geneeskunde 088 708 70 81.