

Longscan

Bij een longscan worden foto's van uw longen gemaakt. Hierop kan de doorbloeding van de longen worden beoordeeld (longperfusiescan). (Soms worden er ook foto's gemaakt waarop de ventilatie (luchtdoorstroming) van de longen kan worden bekeken: longventilatiescan.)

Vorbereidingen op het onderzoek

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. U mag dus normaal eten en drinken en uw gewone dagelijkse bezigheden uitvoeren.

- Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Daarom kan u gevraagd worden sieraden, sleutels en andere metalen voorwerpen te verwijderen of bepaalde kledingstukken uit te trekken.
- Begeleiding is toegestaan, maar in verband met de beperkte wachtruimte vragen wij u niet meer dan één persoon mee te nemen.
- Tijdens het onderzoek zelf kan er in principe geen begeleider bij u zijn.
- Bent u zwanger, denkt u dit te zijn, of geeft u op dit moment borstvoeding, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

Bij aankomst op de afdeling nucleaire geneeskunde meldt u zich aan de balie bij de secretaresse. Voor de longperfusiescan wordt u meegenomen naar een onderzoekskamer waar u een injectie met een licht radioactieve vloeistof krijgt toegediend. Deze vloeistof wordt in een bloedvat in uw arm gespoten. Tijdens deze injectie ligt u op de onderzoekstafel en moet u een keer hoesten en enkele malen diep inademen. Na de injectie wordt direct een aantal foto's van de longen gemaakt. De totale duur van dit onderzoek bedraagt ongeveer een half uur.

(Indien een longventilatiescan noodzakelijk is kan het zijn dat één of enkele dagen later het onderzoek wordt herhaald. Er zullen dan ook foto's gemaakt worden van de ventilatie van de longen. Hiervoor krijgt u dan gedurende elke foto een kapje op de neus. Via dit kapje ademt u dan een luchtmengsel met een radioactieve stof in. Dit heeft geen (toename van) benauwdheid tot gevolg. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.)

De uitslag

Om te horen wat het onderzoek heeft uitgewezen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Bijwerkingen

De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt zijn niet nadelig voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel weer uit uw lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen bijzondere maatregelen te nemen. Door dit onderzoek krijgt u geen overgevoelighedsreacties, ook niet als u overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen. De rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.

Opmerkingen

Als u binnen vier weken na uw onderzoek of behandeling een vliegreis gaat maken, meld dit dan bij de secretaresse van de afdeling nucleaire geneeskunde. U krijgt dan een 'vliegbrief' mee, waarmee u kunt aantonen dat u een onderzoek of behandeling met radioactieve stoffen heeft gehad.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo twitter.com/ZGT_info linkedin.com/company/zgt youtube.com/user/ZGTinfo zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust. U kunt daarvoor bellen met de afdeling nucleaire geneeskunde: 088 708 56 70.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt