

## Blindedarm operatie kind

Uw kind heeft zojuist een operatie ondergaan vanwege een ontstoken blindedarm. In deze folder kunt u lezen welke nazorg er geboden wordt na de ingreep.

### Na de ingreep

Na de operatie heeft uw kind een infuus. Als uw kind weer goed drinkt kan dit verwijderd worden. Vooral de eerste dag heeft uw kind pijn in de buik. Uw kind krijgt standaard, gedurende de eerste 48 uur, medicijnen tegen de pijn. Meestal in de vorm van zepillen. Daarna wordt alleen pijnbestrijding gegeven als het nodig is.

Direct na de operatie wordt uw kind drinken aangeboden in de vorm van water, ranja of appelsap. Als dit goed gaat, wordt het uitgebreid met licht verteerbaar voedsel. De dag na de operatie kan uw kind meestal weer gewoon eten.

Na enkele dagen beginnen de darmen 'weer op gang te komen'. Dit kan wat buikpijn veroorzaken.

De verpleegkundige zal regelmatig de wond controleren. Zo gauw uw kind zich daartoe in staat voelt, mag het even uit bed. Zorg in elk geval voor gemakkelijk zittende kleding. Afhankelijk van het verloop van de operatie mag uw kind na een ongecompliceerde blindedarm operatie waarschijnlijk de volgende dag al weer naar huis.

Na twee dagen mag uw kind weer onder de douche. Als de wond droog is hoeft er geen nieuwe pleister meer op.

Is er sprake van een doorgebroken (geperforeerde) blindedarmontsteking zal uw kind langer moeten blijven en afhankelijk van de mate van ontsteking een aantal dagen antibiotica per infuus krijgen. Ook het drinken en eten wordt langzaam opgebouwd.

### Nazorg thuis

De eerste week moet uw kind het rustig aan doen. Het mag niet rennen, fietsen en/of zwemmen. Ook is het verstandig om uw kind de eerste week nog niet naar school te laten gaan.

Bij kinderen worden vaak oplosbare hechtingen gebruikt. Deze hoeven niet verwijderd te worden. Eventuele niet-oplosbare hechtingen worden tijdens het bezoek aan de polikliniek verwijderd.

### Complicaties

Soms komt het voor dat er thuis toch nog complicaties optreden, bijvoorbeeld koorts boven de 38,5°C of buikpijn. Dit ondanks de pijnstilling of na enige tijd. In dit geval kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de polikliniek heelkunde (chirurgie) en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

#### *Polikliniek heelkunde*

Telefoonnummer 088 708 52 31  
Routenummer 1.08

#### *Spoedeisende hulp*

Telefoonnummer 088 708 78 78

#### *Polikliniek kindergeneeskunde*

Telefoonnummer 088 708 31 20  
Routenummer 0.11

### Controleafspraak

U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een controleafspraak mee voor de behandelend specialist.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

### **Tot slot**

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw behandelend specialist aan u kenbaar gemaakt worden.

### **Vragen?**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek heelkunde.