

Reconstructie van het overgebleven schisisdefect (8-12 jaar)

Uw kind is al een aantal keren geopereerd vanwege de lip- en gehemeltepleet (schisis). Na deze operaties is er nog een gat in het bot van het gehemelte overgebleven waardoor uw kind door de neus praat. Daarom wordt dit gat gesloten. Dit doet de kaakchirurg door ergens anders (bijvoorbeeld uit de kin of de heup) een stukje bot weg te nemen en daarmee het gat in het bot van het gehemelte op te vullen. Uw kind heeft dus twee operatiewonden. Wanneer de operatiewond in de mond genezen is, zal naar verwachting de spraak van uw kind verbeteren.

Preoperatieve polikliniek

Als voorbereiding op de operatie wordt uw kind op de polikliniek preoperatieve screening onderzocht. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt de pijnmedicatie afgesproken en wanneer uw kind de laatste voeding mag hebben. Ook krijgt u een recept en een folder 'Paracetamol kinderen' en 'Anesthesie kinderen' mee.

Vorbereidingen thuis

- Houdt uw kind nuchter vanaf de afgesproken tijd;
- Geef uw kind volgens afspraak de eerste paracetamol zetpil;
- Laat uw kind douchen;
- Laat uw kind schone, gemakkelijk zittende kleding aantrekken.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze toe zoals afgesproken is bij uw bezoek aan de preoperatieve screening.

Wilt u het volgende meenemen?

- Schone kleding en toiletartikelen;
- Eventueel eigen (dieet)voeding;
- Knuffel of speelgoed;
- Eventuele eigen medicijnen.

Wilt u alstublieft geen broertjes of zusjes mee te nemen op de dag van de operatie.

Wij vragen u dringend contact op te nemen met de polikliniek kaakchirurgie als uw kind:

- Koorts heeft of ziek is;
- In contact is geweest met iemand met een besmettelijke kinderziekte.

De operatie

Wanneer uw kind aan de beurt is voor de operatie wordt u begeleid naar de operatiekamer. Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer tot uw kind onder narcose wordt gebracht.

De operatie duurt ongeveer negentig minuten en wordt uitgevoerd door de mond-, kaak- en aangezichtschirurg samen met de plastisch chirurg. Na de operatie mag één van de ouders naar de uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, gaat u samen met uw kind en een verpleegkundige terug naar de kinderafdeling.

Na de operatie heeft uw kind een infuus en soms een neus-maagsonde.

Terug op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling houden wij uw kind goed in de gaten. Bovendien leggen wij uw kind aan een monitor, waarmee het in ieder geval de eerste nacht bewaakt wordt. Uw kind kan bijvoorbeeld onopgemerkt nabloeden. Dit komt omdat kinderen de neiging hebben alles door te slikken wat in de mond komt. Om die reden kan de bloeddruk regelmatig gemeten worden.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Pijnbestrijding

Voor goed herstel is het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft. Pijnbestrijding wordt gegeven via een infuus en met zetpillen. Verpleegkundigen houden met behulp van meetinstrumenten goed bij of- en hoeveel pijn uw kind heeft na de operatie. Als u denkt dat uw kind ondanks dat pijn heeft, meldt u dit aan de verpleegkundige zodat deze de benodigde pijnstillers kan geven.

Wondverzorging

Om de wonden te controleren, gaat uw kind tijdens de opname dagelijks naar de polikliniek. De chirurg inspecteert dan de mond en de mondhygiëniste verzorgt de wond in de mond. Hierbij wordt vooral gelet op nabloeden. Wanneer er een tampon is geplaatst, zal de chirurg deze vijf tot zes dagen na de operatie verwijderen.

Medicijnen

Uw kind krijgt vijf dagen lang antibiotica, eerst via het infuus. Daarna kan de antibiotica als tablet of capsule ingenomen worden. dat is om een wondinfectie te voorkomen. Uw kind krijgt gedurende twee weken een mondspoeling met chloorhexidine voorgeschreven. Vanaf de eerste dag na de ingreep twee maal per dag spoelen met de vloeistof gedurende één minuut, vervolgens uitspugen.

Eten en drinken

Na de operatie zit er soms een soort gaastampon vastgemaakt op het gehemelte. Om de wondgenezing zo weinig mogelijk te verstoren, krijgt uw kind sondevoeding gedurende ongeveer drie dagen. Daarna mag uw kind meestal weer voorzichtig wat proberen te drinken. De neusmaagsonde wordt pas verwijderd na overleg met de chirurg en de kinderarts. Doorgaans wordt op de derde dag na de ingreep gestart met glad gebonden vloeibare voeding.

Naar huis

De chirurgen en de kinderarts bepalen wanneer uw kind naar huis mag. Meestal is dit de vijfde of zesde dag na de operatie.

Controleafspraak

U krijgt voor uw kind een controleafspraak bij de chirurgen en de mondhygiëniste voor ongeveer een week na de operatie.

Richtlijnen voor thuis

Eten en drinken

- In de eerste drie weken na de operatie mag uw kind geen scherpe voorwerpen in de mond stoppen, niet met een rietje drinken en liever niet duimzuigen;
- Spoel de mond dagelijks twee maal met chloorhexidine;
- Geef uw kind gedurende twee weken glad gebonden vloeibare voeding. Daarna mag uw kind geleidelijk weer normaal eten;
- Geen neus snuiten, veeg de neus alleen af als dit nodig is.

Pijn

Geef uw kind de pijnstillers die zijn voorgeschreven als uw kind aangeeft pijn te hebben.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook bij deze operatie is er kans op complicaties. Deze zijn niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een nabloeding of een wondinfectie.

Wanneer neemt u contact op

- Als de wondjes weer beginnen te bloeden;
- Als uw kind meer dan 39°C koorts heeft;
- Als uw kind ondanks de pijnstillers pijn heeft.

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met:

Ziekenhuislocatie Almelo

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 088 708 52 45.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 088 708 33 80.

Spoedeisende hulp

Neem buiten kantoortijden contact op met de spoedeisende hulp.

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Medisch Spectrum Twente Enschede

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 0541 57 43 80.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 053 487 27 20.

Neem buiten kantoortijden contact op met:

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 053 487 20 00.

Victor Veau stichting

Telefoonnummer 06 30 37 73 65

E-mail: secretariaat@schisis-team.nl.

Kijk voor meer informatie ook op:

schisis-team.nl.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw behandelend specialist aan u kenbaar gemaakt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek mond-, kaak en aangezichtschirurgie.