

Oor correctie

Het afstaan van oorschelpen is een aangeboren afwijking. De afstand van de rand van de oorschelp tot het hoofd is dan te groot. Dit kan enkelzijdig en dubbelzijdig voorkomen. Soms gaat het alleen om de bovenzijde van het oor. Het is altijd een gevolg van een abnormale vorm van het kraakbeen. Een flapoor kenmerkt zich door het ontbreken van de normale plooi in het kraakbeen. Dit is operatief te corrigeren.

De operatie

De ingreep vindt meestal onder narcose plaats, maar kan bij volwassenen of oudere kinderen ook goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. In het geval van algehele anesthesie gebeurt het in een dagbehandeling. Bij plaatselijke verdoving volstaat een poliklinische behandeling. Via een huidsnede aan de achterzijde van de oorschelp wordt de spanning van het kraakbeen door insnijdingen zodanig verminderd dat de oren na afloop van de procedure dicht bij het hoofd blijven staan. De oren worden in deze stand gefixeerd door middel van een zogenaamd tulbandverband, dat rond het hoofd wordt aangebracht.

Na de behandeling

U mag dan uw haren wassen, maar spoelt u het wel goed na.

De plastisch chirurgie geven er de voorkeur aan zelf oplosbare hechtingen te gebruiken. Het voordeel is dat die niet verwijderd hoeven te worden, maar soms duurt het wel een paar weken voordat ze oplossen.

Na verwijdering van het tulbandverband (na 1 week) moeten de oren nog 2 weken gedurende dag en nacht worden gesteund met een haarband (of een zweetband, zoals gebruikt wordt door sporters). Daarna moet de haarband nog 2 weken 's nachts worden gedragen.

De zwelling verdwijnt in enkele weken en na ongeveer 3 maanden kan van een eindtoestand worden gesproken. De meeste patiënten hebben weinig last van de operatie en van de periode daarna. Gedurende de eerste winterperiode na de operatie kan kou

als pijnlijk worden ervaren. Na een jaar komen deze klachten meestal niet meer voor.

Risico's/complicaties

Complicaties, zoals een bloedingstorting of een infectie, komen gelukkig weinig voor.

Naar huis

Het is van groot belang dat het verband gedurende ongeveer een week blijft zitten, waarna het op de polikliniek wordt verwijderd. De afspraak hiervoor krijgt u mee. De oren zijn na een week nog wat gezwollen en soms blauw verkleurd.

Tegen de pijn kunt u tot maximaal 4 maal daags 2 tabletten van 500 mg paracetamol nemen. Zie bijsluiter paracetamol voor verdere doseringen.

Contact gegevens/meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze gerust, wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Wanneer zich na de operatie problemen voordoen, kunt u contact opnemen met het secretariaat plastische chirurgie. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur, telefoonnummer 088 708 52 45.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

De mogelijkheid bestaat dat u dan naar de eerste hulp van een ander ziekenhuis wordt verwezen. Dit komt omdat de maatschap plastische chirurgie dienst heeft voor de hele regio.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt