

Het verloop van de **Irinotecan/ Fluorouracil/Leucovorin/Bevacizumab**

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **I**rinotecan
2. **F**luorouracil
3. **L**euovorin
4. **B**evacizumab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I							I							I						
F							F							F						
L							L							L						
B																				

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
I																				
F																				
L																				
B																				

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op oncologiepoli van ZGT. Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om bijwerkingen tegen te gaan.

De toediening duurt ongeveer 2 uur, waarbij de eerste en de vierde kuur door de bevacizumab langer duren. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen 4 keer wekelijks gegeven, gevolgd door 2 weken rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door de bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd.
- Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan 4x daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van de Bevacizumab staan beschreven in het bijgeleverde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen