

Het verloop van de ECC kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **E**pirubicine
2. **C**isplatin
3. **Ca**pecitabine (= Xeloda)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
E	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca						
C																				
Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca						

Wijze van toediening

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling oncologie van de ZGT. De Cisplatin en Epirubicine worden u toegediend op dag 1. Hierna wordt u 1 nacht opgenomen voor het toedienen van extra vocht. De Capecitabine kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U start hiermee op de avond van dag 1 en gaat hiermee door t/m de ochtend van dag 15.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 2 à 3 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door Epirubicine, is tot enkele dagen na de kuur rood verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na toediening niet te dragen.
- Om de schadelijke werking van de cytostatica op uw nieren te verminderen, krijgt u tijdens de behandeling extra vocht toegediend. Daarvoor moet u een nacht opgenomen worden.
- U kunt vocht vast gaan houden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- U kunt last krijgen van pijn op de borst, geef dit altijd door aan uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u 4x daags bodylotion/handcrème of 10% ureumzalf gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 9 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.