

Behandeling ijzerinfuus bij MDL-patienten

Uw specialist heeft u vanwege een ijzertekort een infuus met het medicijn Monofer voorgeschreven. Voor deze behandeling wordt u een dagdeel of korter opgenomen op de afdeling dagbehandeling locatie Almelo of Hengelo van ZGT. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en gang van zaken in het ziekenhuis.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een ijzerinfuus. De afspraak is gepland op:

Dag.....

Datum.....

Tijd.....

Melden

Op de dag van de afspraak wordt u verwacht:

- Almelo: bij de dagopname, Routenummer 1.4
- Hengelo: bij de receptie bij de hoofdingang

Het belang van ijzer voor uw lichaam

Rode bloedcellen hebben hun rode kleur te danken aan het eiwit hemoglobine. De voornaamste functies van hemoglobine zijn:

- transport van zuurstof van de longen naar het weefsel in het lichaam
- transport van koolstofdioxide van het weefsel terug naar de longen.

Net zoals zuurstof is ijzer een noodzakelijke stof in het lichaam. Deze stof zorgt ervoor dat zuurstof zich kan binden aan hemoglobine. IJzer is betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van uw lichaamsfuncties. Kortom: ijzer is belangrijk voor een goede conditie, bevordert de concentratie en het houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes.

Zo komt ijzer in uw lichaam

Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan. Daarom moet u dagelijks genoeg ijzer via uw voeding binnen krijgen. Ongeveer 10% van het ijzer dat u via uw voeding binnenkrijgt, komt via de darm in het bloed terecht. Daar bindt het zich aan transferrine. Dit is een stof in uw lichaam die ervoor zorgt dat het ijzer op die plaatsen in het lichaam komt waar het nodig is. Het ijzer dat het lichaam niet direct nodig heeft, wordt in de lever en de milt opgeslagen.

Een ijzertekort

Als u via uw voeding onvoldoende ijzer binnenkrijgt, of als uw lichaam onvoldoende ijzer opneemt, zal het de ijzervoorraad in de lever en milt aanspreken. Als die voorraad op is, ontstaat een ijzertekort en kan bloedarmoede ontstaan.

Behandeling met Monofer

Monofer is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam.

Vorbereiding thuis

Voor de behandeling met het medicijn Monofer hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.

Meenemen naar het ziekenhuis

De behandeling duurt één à twee uur. U kunt desgewenst een boek, tijdschrift of iPad/smartphone meenemen. In het ziekenhuis is Wifi beschikbaar. U kunt ook iemand meenemen om tijdens de behandeling bij u te zijn. Denk verder aan een geldig

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) bij de afdeling waar u wordt verwacht. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken in het ziekenhuis

U wordt ontvangen door een verpleegkundige. Er vindt controle van uw temperatuur, pols en bloeddruk plaats. Er worden gegevens verzameld en u krijgt een infuusnaaldje. Via dit infuusnaaldje krijgt u vervolgens het medicijn toegediend.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met het medicijn Monofer auto te rijden.

Bloedcontrole zal plaatsvinden tijdens de volgende afspraak op de polikliniek MDL.

Bijwerkingen

Het medicijn Monofer kan tijdens het toedienen of als u weer thuis bent bijwerkingen veroorzaken. Hieronder staan bijwerkingen die mogelijk voorkomen. De volgende klachten kunnen zich voordoen:

- hoofdpijn
- duizeligheid
- metallische smaak in de mond
- misselijkheid
- buikpijn
- verstopping
- diarree
- uitslag
- reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten (branderig pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek).

De klachten gaan doorgaans vanzelf over. Als u het niet vertrouwt of als u zich zorgen maakt, meld dit dan bij de verpleegkundige van de afdeling. U kunt ook bellen: telefoon: 088-708 70 70

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U kunt bellen naar het MDL centrum: 088 708 70 70.