

Het verloop van de irinotecan / capecitabine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Irinotecan**
2. **Capecitabine (=Xeloda)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							

Wijze van toediening:

Het medicijn irinotecan wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. U krijgt voor de chemokuur medicatie in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend om bijwerkingen tegen te gaan.

De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. De capecitabine kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U start hiermee op de avond van dag één en gaat hiermee door t/m de ochtend van dag 15. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 ° C moet u contact met ons opnemen.
- Als meest voorkomende bijwerking kan diarree optreden. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier keer daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon. De behandeling van diarree kan obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee a drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint vaak met een pijnlijke hoofdhuid. In enkele gevallen kan de haaruitval acuut optreden. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- In verband met de mogelijke bijwerkingen moet u na de eerste en tweede kuur nog een uur nablijven. Tevens wordt tijdens deze toediening de bloeddruk gecontroleerd. Het is niet aan te raden zelf naar huis te rijden in verband met mogelijke duizeligheid en wazig zien.
- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u vier maal daags bodylotion/handcrème of 10% ureumzalf gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en vier maal per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Wijze van inname capecitabine:

- Neem de capecitabine in met een interval van 12 uur.
- Neem de capecitabine in binnen 30 minuten na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw specialist en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.