

Het verloop van de Rituximab / Bendamustine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **R**ituximab
2. **B**endamustine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R	B																										

Wijze van toediening:

Rituximab en bendamustine worden toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de oncologiepoli van ZGT. Om een allergische reactie op rituximab te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De toediening duurt ongeveer 3,5 uur. De eerste en tweede kuur duren langer aangezien de rituximab dan langzamer inloopt. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 4 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 4 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo