

## Punctie/ Biopt 3D-CT

Uw behandelend specialist heeft u voor het afnemen van een biopt/ punctie verwezen naar de afdeling radiologie.

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is vooraf met u besproken. De behandeling vindt plaats op de OK. Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo.

### Belangrijk om te weten

#### Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor de behandeling melden.

#### Overgevoeligheden

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor de behandeling. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

### Dieet

Tot een ½ uur voor het melden bij de receptie mag u nog een licht ontbijt gebruiken:

- 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

### Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft uw behandelend specialist u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u **Plavix/Grepid** (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix/Grepid** (clopidogrel) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met **Plavix/Grepid**.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met **Brilique** (ticagrelor).
- Als u **Sintrom** (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier **3 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Marcoumar** (fenprocoumon) gebruikt, dient u hier **7 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Pradaxa** (dabigatran) gebruikt, dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Xarelto** (rivaroxaban) gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Eliquis** (apixaban) gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Lixiana** (edoxaban) gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen, tenzij anders voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom, Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

**Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend specialist.**

### **Kleding**

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de OK, is het niet toegestaan om tijdens de behandeling een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan.

Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen.

Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de behandeling wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen.

Sieraden kunt u het beste thuis laten.

### **Verloop van de behandeling**

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten.

Het streven is u anderhalf uur na opname te behandelen, echter kan het tijdstip uitlopen in verband met spoed patiënten.

U wordt in een bed naar de OK gebracht.

Gedurende het verblijf op de OK wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure).

In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht. Daarna neemt een interventielaborant u mee naar de interventiekamer. Tijdens de behandeling bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Met behulp van 3D-CT technologie zal de interventieradioloog de plek waarvan het weefsel nader onderzocht moet worden in beeld brengen. Het toestel draait daarbij om u heen. Belangrijk is dat u tijdens de behandeling stil blijft liggen. De aanprikplaats en het diepere gelegen weefsel wordt plaatselijk verdoofd. Hoewel u lokaal verdoofd bent kunnen wij niet uitsluiten dat het aanprikken pijnlijk kan zijn.

Om infecties te voorkomen is steriel werken erg belangrijk. Uw huid ter plaatse van de aanprikplaats wordt ontsmet en u krijgt een steriel laken over uw borst, buik en benen. Met behulp van een dunne naald wordt het weefsel aangeprikt en wordt een biopt genomen. Het stukje weefsel wordt voor nader onderzoek naar het laboratorium opgestuurd. Soms is het nodig meerdere stukjes weefsel weg te halen. Na de behandeling wordt de aanprikplaats met een pleister afgedekt.

### **Duur**

De duur van de behandeling is moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het 30 tot 60 minuten.

### **Na afloop van de behandeling**

Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de verpleegafdeling.

Als u op de verpleegafdeling bent kunt u, in overleg met de zaalarts, weer eten en drinken. Meestal wordt 2 uur bedrust geadviseerd, daarna kun u weer mobiliseren. De zaalarts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken. Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u kunt herstarten met uw antistollingsmedicatie.

## Uitslag

U ontvangt de uitslag van de behandeling op de vervolgfafspraak. De vervolgfafspraak wordt of is geregeld door uw behandelend specialist.

## Weer naar huis

Probeer na het onderzoek nog een dag rustig aan te doen, zodat het wondje goed kan genezen. Tenzij u zeer zwaar lichamelijk werk doet kunt u de volgende dag weer gaan werken. De pleister mag u de volgende dag zelf verwijderen.

## Complicaties

Geen enkel 'invasief' onderzoek (onderzoek waarbij de huid of slijmvliezen worden gepasseerd) is zonder risico's.

- Het nemen van bipten/ puncties kunnen leiden tot een bloeding. Over het algemeen stopt deze vanzelf; zeer zelden zal een operatie volgen.
- Het is mogelijk dat bij het aanprikken van het te onderzoeken weefsel de naald door een darmlis gaat. Deze complicatie vereist soms een operatieve correctie. Deze complicatie komt zelden voor.
- Bloeduitstorting ter plaatse van de aanprikplaats. Hoewel een bloeduitstorting/blauwe plek ter plaatse van de aanprikplaats hinderlijk kan zijn, vereist deze zelden een operatieve correctie/ ingreep.

## Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- Toename van pijn.
- Aanprikplaats rood of dikker wordt.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw behandelend specialist.

Buiten kantoor tijden kunt u (bij deze klachten of andere klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag) contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

## Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via secretariaat radiologie, telefoonnummer 088 708 3700.