

## Het verloop van de Critics II studie, arm 2, docetaxel/oxaliplatin/capecitabine met chemoradiatie

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **D**ocetaxel
2. **O**xaliplatin
3. **C**apecitabine(= xeloda)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>						
<b>O</b>																				
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>							

### Wijze van toediening:

Wij dienen u de Docetaxel en de Oxaliplatin toe via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De totale behandeling duurt ongeveer vier uur. De Capecitabine kunt u zelf innemen want dit zijn tabletten. U start hiermee op de avond van dag één en gaat hiermee door tot en met de ochtend van dag vijftien. De volgende kuur start in principe drie weken na dag één als de bloedsuitslagen goed zijn. In totaal krijgt u hiervan twee kuren.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee a drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- Klachten van spier- en/of gewrichtspijn kunnen voorkomen. U mag hiervoor zonodig tot maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- Diarree. Neemt u contact met ons op als u elke dag een toename van vier of meer ontlastingen heeft in vergelijking tot uw normale ontlasting of als u 's nachts diarree heeft.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend specialist.
- Drink zo min mogelijk koude dranken en kleeft u zo warm mogelijk aan.

- Tijdens de toediening van Oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel.
- Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken, vreemd gevoel in de tong.
- U kunt last krijgen van pijn op de borst, geef dit altijd door aan de behandelend specialist.
- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u vier maal daags bodylotion/handcrème of ureumzalf 10% gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en vier maal per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 18 in het lichaamsvocht (onder meer in urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan.

**Wijze van inname capecitabine:**

- Neem de capecitabine in met een interval van twaalf uur.
- Neem de capecitabine in binnen dertig minuten na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water.
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw specialist en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Daarna gaat u starten met de chemoradiatie. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen en radiotherapie. Het schema ziet er als volgt uit.

1. **P**aclitaxel
2. **C**arboplatin
3. **R**adiotherapie

1	2	3	4	5	6	7
<b>P</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>		
<b>C</b>						
<b>R</b>						

### Wijze van toediening:

Wij dienen u de medicijnen toe via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De totale toediening duurt ongeveer drie uur. De eerste kuur duurt langer aangezien de Paclitaxel dan langzamer moet inlopen. De kuur wordt, afhankelijk van de Bloeduitslagen, om de zeven dagen gegeven. Na de chemokuur op dag één, krijgt u de radiotherapie. Deze wordt wekelijks van maandag tot en met vrijdag gegeven. In totaal krijgt u hiervan vijf kuren.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal vier keer daags 1000mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat van deze kuur in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Echter van uw vorige kuur is uw haar al uitgevallen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Het komt af en toe voor dat iemand, ondanks vooraf toegediende medicatie via het infuus, allergisch reageert op deze kuur (tijdens toediening).
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht ( onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt, mag u altijd contact met ons opnemen.