

Longfunctieonderzoek: Longmedicatie

In de onderzoek folders staat vermeld welke medicatie u moet stoppen voor de test.

Medicatie tegen allergie (anti histaminica)

Deze medicatie dient u **u 72 uur** voor het onderzoek te staken.

Acrivastine	Kestine	Promethazine
Aerius	Ketotifen	Ranitidine
Allerfre	Levocetirizine	Reactine
Alimemazine	Loratidine	Rupatadine
Atarax	Mebhydroline	Rupafin
Cetirizine	Mistalin	Semprex
Cimetidine	Mizolastine	Singulair
Cyproheptadine	Mizollen	Tavegil
Claritine	Montelukast	Telfast
Clemastine	Nalcrom	Terfenadine
Desloratidine	Nedeltran	Tinset
Dexchlorfeniramine	Omatomide	Triludan
Dimetindeen	Oxatomide	Xyzal
Ebastine	Periactin	Zaditen
Fenistil	Phenergan	Zantac
Fexofenadine	Polaramine	Zyrtec
Hydroxizine		

Longmedicatie

Langwerkend

Deze medicatie dient u **u 48 uur** voor het onderzoek te staken.

Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Daxas	Roflumilast
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat/vilanterol
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Ultibro	Indacaterol/glycopyrronium
Unilair	Theofylline

Deze medicatie dient u **u 24 uur** voor het onderzoek te staken.

Atimos	Formoterol
Duaklir Genuair	Acidinium + Formoterol
Eklira Genuair	Acidinium
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Flutiform	Formeterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine
Tavegyl	Clemastine

Kortwerkend

Deze medicatie dient u **u 8 uur** voor het onderzoek te staken.

Airomir	Berodual	Fenoterol	Terbutaline
Atrovent	Bricanyl	Salbutamol	Ventolin