

Foto's van de dikke darm (Colon)

Uw behandelend arts heeft u voor het maken van foto's verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen (artsen) en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld. Vervolgens wordt de uitslag vastgelegd in een verslag.

Belangrijk om te weten

- **Zwangerschap**
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit **vóór** het onderzoek melden.
- Het gebruik van de laxeremiddelen kan de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil verminderen.

Vorbereiding

- Het is erg belangrijk dat de dikke darm tijdens het onderzoek goed schoon is. Daarom dient u **twee dagen** voor het onderzoek dieet te houden en uw darmen te laxeren met Magnesiumsulfaat en Bisacodyl.
U krijgt hiervoor een recept. De medicijnen kunt u dan halen bij uw apotheek. Van deze medicijnen kunt u last krijgen van diarree.
- U mag tijdens het onderzoek een T-shirt of hemd zonder knopen dragen.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte en neemt u mee naar de kleedkamer. Bij het maken van een foto is het belangrijk dat het lichaamsdeel waar het om gaat zo min mogelijk door kleding wordt bedekt. De radiodiagnostisch laborant zegt u welke kleding u uit moet doen. Tijdens het onderzoek mag u een T-shirt of een hemd zonder knopen dragen.

In de onderzoekskamer ligt u op een kantelbare tafel. Op een röntgenfoto van de buik zijn de darmen niet goed zichtbaar, daarom wordt gebruik gemaakt van een contrastmiddel (bariumpap) en lucht.

Door een slangetje, dat in de anus wordt ingebracht, laat de radioloog bariumpap in de dikke darm lopen. Dit kan een gevoel van aandring geven maar is niet pijnlijk. Onder doorlichting kijkt de radioloog hoe de pap uw darm vult en maakt hiervan foto's. Vervolgens laat de radiodiagnostisch laborant een gedeelte van de pap weer teruglopen. Daarna wordt via het slangetje lucht in de darm gebracht. Dit kan een opgezet gevoel geven. Soms besluit een arts een injectie in de arm te geven om uw darmen wat te ontspannen. Van alle delen van de dikke darm worden foto's gemaakt.

Aan het eind van het onderzoek blijft u nog even op de tafel liggen. Dit om te kijken of de foto's technisch goed gelukt zijn. Daarna mag u naar het toilet om zoveel mogelijk lucht en pap kwijt te raken. Door de lucht in uw darm kunt u nog wat last hebben van kramp, dit verdwijnt na één tot twee uur.

Na afloop van het onderzoek

Uw ontlasting kan één tot twee dagen licht van kleur zijn. Dit komt door het contrastmiddel en is onschuldig. Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. Na de eerste maaltijd kunt u nog twee tabletten Bisacodyl innemen, hierdoor verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam. Heeft u last van verstopping (obstipatie) dan is het goed één of twee dagen extra te drinken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden. Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt