

Gastroscoopie/Duodenoscopie met sedatie

Uw huisarts of behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van binnen wordt onderzocht. Dit onderzoek gebeurt op het behandelcentrum van ZGT.

In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis, en over de dagopname.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een gastroscoopie op het behandelcentrum. De afspraak is gepland op:

Dag:

Datum:

Specialist:

Tijd:

Melden om:

Melden

op de dag van de afspraak wordt u verwacht;

- Ziekenhuislocatie Almelo; Bij de dagopname, Routenummer 1.4.
- Ziekenhuislocatie Hengelo; Bij het behandelcentrum, Routenummer 0.4

Midazolamsedatie/propofolsedatie

Een gastroscoopie kan plaatsvinden onder twee soorten sedatie, namelijk onder midazolamsedatie (lichte roes) of onder propofolsedatie (matige diepe sedatie). Welke sedatie u krijgt is afhankelijk van de beslissing van de specialist. Bij een propofolsedatie zult u voorafgaand aan de gastroscoopie naar de pre-operatieve screening (POS) moeten.

U krijgt tijdens het onderzoek de volgende sedatie;

- Midazolamsedatie
- Propofolsedatie

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vorbereidingen

- De dag van het onderzoek mag u vanaf 's nachts 00:00 uur niet meer eten of drinken.
- Als het onderzoek 's middags na 13.00 uur plaatsvindt mag u nog een licht ontbijt (een naturel beschuit met een kopje thee). Bij propofolsedatie mag u dit ontbijt nuttigen tot 6 uur voor het onderzoek. Bij Midazolamsedatie mag u dit ontbijt nuttigen tot 4 uur voor het onderzoek.
- Vertel uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist of u medicijnen gebruikt, allergisch bent, een longziekte hebt, zwanger bent of ooit aan de maag geopereerd bent;
- U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij anders met u is afgesproken;
- Regel vooraf de thuisreis. U mag vanwege de sedatie niet zelf rijden en niet alleen met het openbaar vervoer.

Het onderzoek

Een verpleegkundige die u tijdens het gehele onderzoek zal begeleiden, haalt u op uit de wachtkamer zodra alles gereed is voor uw onderzoek. Zij zal u een naaldje in de hand/arm geven waardoor de sedatie zal worden toegediend.

In de behandelkamer wordt u verzocht eventuele gebitsprothese en/of bril te verwijderen.

Via de infuusnaald krijgt u van de arts of de sedatiespecialist de sedatie toegediend. Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed worden door bewakingsapparatuur in de gaten gehouden.

Het onderzoek wordt op uw linkerzijde uitgevoerd. Via de mond wordt het slangetje ingebracht, waardoor de arts de binnenkant van uw maag kan bekijken. In sommige gevallen wordt een klein stukje weefsel op pijnloze wijze uit de maagwand genomen. Soms kan tijdens het onderzoek een behandeling worden gedaan. Dit is meestal

voor het begin van het onderzoek bekend en u zult hiervan reeds op de hoogte zijn. Ter voorkoming van onnodige afbreking en herhaling van het onderzoek, gaan we ervan uit dat u hiervoor toestemming geeft. Indien dit niet het geval is, gelieve dit van te voren kenbaar te maken. De specialist zal deze ingreep na afloop van het onderzoek met u bespreken.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt van begin tot eind ongeveer een kwartier. U zult in verband met de sedatie nog wel langere tijd op de afdeling verblijven.

Na afloop van het onderzoek

Als u wakker bent komt de arts altijd even bij u om u een voorlopige uitslag van het onderzoek te geven.

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt dit met u. De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of behandeling wordt geadviseerd.

Uw arts zal dit dan ook met u bespreken.

Complicaties

Tijdens het onderzoek is er een minimale kans dat er in de slokdarm of maag een gaatje (perforatie) ontstaat. Met name is deze kans aanwezig indien een vernauwing moet worden opgerekt. Indien deze complicatie zich voordoet, kan deze vaak zonder operatie worden behandeld. U wordt hiervoor wel direct opgenomen in het ziekenhuis.

Medicatie

Indien u medicijnen gebruikt mag u deze tot vier uur voor het onderzoek nog innemen. Soms worden tijdens de gastroscopie kleine ingrepen verricht, zoals het wegnemen van een stukje weefsel voor biopsie. Als u bloed verdunnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. In overleg met de verpleegkundige/specialist zal dit eventueel worden aangepast. Na het

onderzoek hoort u van de specialist die het onderzoek verricht heeft, wanneer u weer mag starten met de bloed verdunnende medicijnen. Bent u diabeet en gebruikt u hiervoor medicatie of insuline ook dán krijgt u van de verpleegkundig/specialist hierover een advies. Neemt u de medicatie voor de diabetes, mee naar het ziekenhuis. Het is verstandig altijd een lijstje bij u te hebben met medicijnen die u regelmatig gebruikt.

Begeleiding na sedatie

- Voor zowel midazolamsedatie als voor propofolsedatie geldt; u mag na de behandeling/het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis, Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis. LET OP; Als dit niet geregeld is kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan!
- Bij midazolamsedatie; U mag tot 24 uur na de sedatie niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, dus ook geen auto rijden, niet zelfstandige gebruik maken van het openbaar vervoer. Neem deze dag geen belangrijke beslissingen. U kunt vergeetachtig zijn.
- Bij propofolsedatie; zie voor informatie over begeleiding in middag, avond en nacht, deelname aan het verkeer, werken, alcoholgebruik de patiëntenfolder '*Sedatie en/of analgesie tijdens onderzoek of behandeling*'. Deze krijgt u tijdens de POS afspraak. Deze krijgt u tijdens de pre-operatieve screenings afspraak bij de afdeling opname, planning en anesthesie.

Hulp/gezelschap

Indien u na het onderzoek naar huis gaat mag u, in verband met het uitwerken van de sedatie, niet alleen thuis zijn. Zorgt u daarom voor begeleiding voor de middag en avond. Mocht u propofolsedatie hebben gehad dan mag u ook de nacht na het onderzoek niet alleen thuis zijn.

Dagopname

Dag van het onderzoek

Dagopname wil zeggen dat een patiënt 's morgens of 's middags naar het ziekenhuis komt en in de meeste gevallen in de loop van de dag weer naar huis gaat.

Vorbereiding thuis

- Draag prettige en niet te strakke kleding.
- U mag na het onderzoek/behandeling in verband met het roesje wat u heeft gehad, niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis of dat iemand u ophaalt na de behandeling. LET OP; als dit niet geregeld is, kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan.

Wat neemt u mee voor de dagopname?

- De medicijnen die u gebruikt
- Eventueel iets om te lezen

Wat neemt u niet mee?

Wij verzoeken u geen sieraden, geld of andere waardevolle zaken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Wat gebeurt er op de afdeling dagopname?

Op de dagopname wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u en uw eventuele begeleider het tijdstip waarop u naar huis mag. Vervolgens vindt zo nodig, controle van uw temperatuur, pols en bloeddruk plaats. Er worden gegevens verzameld en als het onderzoek met sedatie plaatsvindt zult u een infuusnaaldje krijgen. Dit gebeurt voordat u naar de onderzoekskamer wordt gebracht. Voor de patiënten in Almelo geldt; De begeleider mag voordien mee naar de patiëntenkamer, hier wordt door de verpleegkundige concrete afspraken gemaakt met de begeleiding voor/over het ophalen van de patiënt.

Patiëntveiligheid

ZGT ziet patiëntveiligheid als een vanzelfsprekende basis voor goede zorg en dienstverlening. Verschillende zorgverleners vragen daarom uw naam, geboortedatum en voor welke operatie of ingreep u komt. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze controle is voor uw veiligheid.

Belangrijk

Zorg voor een contactadres/ telefoonnummer tijdens uw korte verblijf in het ziekenhuis. Op de dagopname bestaat geen mogelijkheid bezoek te ontvangen van uw familie of bekenden. Zorg er voor dat er iemand in huis is als u thuis komt.

Het onderzoek

U krijgt een bed toegewezen op de dagopname. De arts geeft u via de infuusnaald een slaapmiddel. Hierna volgt het onderzoek.

Na het onderzoek komt u weer terug op de patiëntenkamer, hier kunt u uitslapen.

Uitslag

De specialist komt bij u langs voordat u naar huis gaat. U hoort dan de eerste bevindingen van de specialist.

Nazorg

In verband met de toegediende sedatiemiddelen mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer na het onderzoek. (zie ook de verzekeringsvoorwaarden in uw WA en/of verkeerspolis). Laat u daarom begeleiden door een familielid/kennis.

In verband met de sedatie is het advies om deze dag geen belangrijke beslissingen te nemen. U kunt vergeetachtig zijn.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Complicaties komen bij dit onderzoek heel zelden voor. Wanneer u echter na afloop van het onderzoek toenemende pijn of koorts krijgt of bloed moet opgeven dan kunt u

bellen naar het ziekenhuis en vragen naar de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Vanaf de volgende ochtend belt u bij problemen het MDL-centrum. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur, telefoonnummer 088 708 70 70.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben stel ze dan gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum telefoonnummer, 088 708 70 70.